

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百四十三

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣陸維新

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十三 明 周王朱櫛 撰

妊娠諸疾門

滑胎 附論

夫婦人難產者皆因燥澁緊斂故產戶不得開通宜先於降誕之月自入月之日用長流水調益元散日三服產必易產後亦無一切虛熱氣血不和之疾如未入月則不宜服之以滑石滑胎故也

方

滑胎九

出聖惠方

妊娠令易產益氣

赤茯苓

赤芍藥

各一兩

檳榔

二兩

芎藭

半兩

訶梨勒皮

三枳殼

半兩麩炒微黃去瓢

川大黃

一兩剉微炒

麥門冬

一兩半去心焙

厚朴

去皮薑炒一兩

右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大食前

溫酒二十九下

甘草散

出聖惠方

凡臨月前服之入月兒生墮地不覺

甘草

二兩

黃芩

三兩 酒浸

大麻仁

三錢

吳茱萸

三錢 湯浸 七次炒

乾薑

炮三錢

大豆黃卷

一兩種 濕地令牙 出晒乾取牙用

肉桂

三錢 去皮

右搗細為散每日空心以米飲調一錢下

臨月前預服此藥令易產方

出聖惠方

冬葵子

一兩 滑石半

瞿麥

炒 丹參

各一兩半

酥

蜜

各一合

右搗篩以水一大盞煎取半大盞去滓內酥蜜和調

空心以米飲下一匙食前再服

榆白皮散

出三方

治臨產預服滑胎

榆白皮 槐枝 瞿麥 木通 大麻仁

各等分

右剉散每服五大錢水二盞煎七分去滓日二服

滑胎催生神效方

益元散

一兩 蛇退

一條燒灰湏要
塲頭及籬上

蟬退

五箇全

男子亂髮

入油一兩
內熬化

穿山甲

一箇燒
存性

右為末蘆水一碗入藥一處煎一沸與髮攪勻冷服
酥膏令易產入月便服兒不覺出或有難產經數日或
生不以理百方千計終不平安者服此膏總在兒身

上立生初服半匙漸加至一匙若太多恐嘔逆以意

節量服之佳

出聖惠方

真牛酥

升一

秋葵子

斤一

白蜜

半斤

滑石

搗末

瞿麥

一兩

炒

大豆黃卷

五錢

右搗粗散先以清酒一斤細研葵子內酥蜜中微火消即下諸藥緩火煎常令如魚眼沸約煎去半即成膏以綿濾貯於瓷器中每於食前如上所說服之

滑胎丹參膏

一名丹參膏出聖惠方見本門前養胎氣類丹參膏

滑胎催生散

出聖惠方

葵子

滑石

各一兩

蒲黃

木通

到各半兩

右搗細散每食前以溫酒調下一錢

滑胎令易產方

出聖惠方

白蜜

一合猪脂二合酒半斤

右同於銀器中慢火熬令稍稠每服於空心以酒下

一大匙

榆白皮散

出余居士選奇方

治妊娠滑胎易生

榆白皮 甘草 各二兩 葵子 一兩

右為粗末每服三錢水一盞煎七分去滓溫服一方

無榆白皮名葵子散

車前子散 出聖惠方 滑胎令易產

阿膠 八兩 滑石 三兩 車前子 一升

右治下節飲服方寸匕日再至生月乃服藥利九竅

不可先服一方用蜜湯調服

神寢丸 瘦胎滑利易臨入月服之極有神效知蘄州

施少卿方徐太丞傳

通明乳香

半兩
別研

枳殼

一兩

右為細末煉蜜丸如梧子大空心溫酒吞下三十九日一服懷孕九箇月以後方可服一方名寤生丸用乳香一錢酒糊為丸一方加當歸木香各等分治婦人胎氣不足能令胎滑易產常服養胎益氣安和子臟

枳殼散 瘦胎易產抑陽降氣兼治胎中一切惡疾湖

陽公主服效

一名六一散

枳殼

小厚突者麤炒去瓢二兩又方用糯米浸控乾炒赤色尤佳

粉草

炙一兩

右為細末每服二錢沸湯調空心日三服之至七月方可服忌登高廁若大便秘澀加防風體弱加大當歸去尾木香各等分如胎肥壅滯動止艱難臨產難生加乳香髮灰效枳殼能逐水消脹滿逆氣若臨月多服則當產之時無脹滿逆氣產道順而易生誠有補於世也又治腸中諸疾下氣寬膈加炒去毛香附

子一兩為末薑湯調下冷氣攻刺脇肋疼痛葱白湯
調下脾寒血氣成塊作痛熱酒調下大小便不通白
牽牛為末加入熱湯調服一方枳殼六兩甘草一兩
故加枳殼減甘草蓋未產人甘草性寒故也未產前
一月日服三忌登高廁一方冷氣能飲者細嚼葱白
熱酒調下服胃膈氣閉飲食不進葱白湯調服 腎
氣腫痛煨葱白二寸茴香一撮同嚼熱酒嚥下若久
久服之永不發動腰背氣痛葱白湯調服服訖即卧

少時旋能作效 脚氣發動空心熱酒或木瓜煎湯
調下產後血氣不和熱酒調服心腹疼痛口吐清水
飲食不進胃膈膨脹鹽湯調服冷物傷脾發痛無時
胡椒煎湯調下婦人血暈兩太陽疼痛頭旋欲倒者
艾葉煎湯服小兒面黃胃冷吐食木瓜煎湯調服婦
人經血不行手足發熱或身潮熱先用葱白湯次用
菖蒲湯調服若經血不行脾胃稍壯者當用大聖散
服之數月特有神效若經血不調血臟冷痛者當用

大聖散間以小溫經湯仍以紅丸子佐之

又方

用糯米半升淘洗控乾炒為末以米飲白湯調下

一二錢服之

又方 治產前滑胎

用臘月兔頭髓一箇攤於紙上令勻候乾剪作符
子於面上書生字一箇覺母陣痛時用母釵子股
上夾定燈焰上燒灰盛盛煎丁香酒調下

滑胎令易產

出聖惠方

用大麻根二兩剉以水二中盞煎至一盞去滓服

易產滑胎方

一名芣苢散
出永類鈴方

用車前子為末酒服方寸匕不能飲者水調詩

云芣苢能令婦人樂有子矣

治產前滑胎

用牽牛子一兩赤土少許研細母覺陣痛時煎榆

白皮湯調下一錢

枳殼散 治滑胎調氣利胸膈消積滯和脾胃進飲食
常服亦得

枳殼

二兩

桑白皮

一兩剉以水三椀與枳殼同煎煮乾取出去滓淨洗細切焙乾用只

桑白皮

人參

半兩

糯米

二兩炒黃色

木香

一錢不見火

甘草

一兩炙

麥蘖

半兩炒黃

右為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服日可五服
不拘時候

治滑胎易產

出產胎救急方

枳殼

五兩

阿膠

炒

甘草

一兩

右為末湯調服

又方

出胎產救急方方見本門前下痢類縮胎散

東胎丸

出保命集

白朮

枳殼

去熟炒等分

右為末燒飯為丸如桐子大八月一日食前服三五
十丸溫熱水下胎瘦易生也服至產則已

治婦人臨產渾身痛漿破血下未得分解催產方須是

漿破血下然後可喫若孕婦漿未破血未下須是渾身痛甚腰痛忽輕及數日身體困重亦可進服凡渾身痛須是腰痛方是欲產也若未是正產誤喫此藥即損母性命須是正產不下方可喫也

官桂

不見火者
二兩去皮

牡丹皮

去心

當歸

牛膝

木通

滑石

冬葵子

各等分

右為細末每服六錢水一盞半葱五枝煎取一盞三分空心和水滓喫如人行一里再喫以兒生為度

治日月未足而欲產者

出本草

取槐樹東枝令孕婦手把即易產

又方

出本草

搗菖蒲根汁一二升灌喉中

主易產

出本草

以弓弩絃燒灰為末用酒服二錢正即易生一方

縛心下立產

又方

出本草

以麝香一錢研水調之服立產

鬼胎 附論

夫鬼胎者何人之臟腑調和則血氣充實風邪鬼魅不能干之若榮衛虛損則精神衰弱妖魅鬼精得入於臟狀如懷娠故曰鬼胎也

方

牡丹散

出聖惠方

治婦人鬼胎腹內痞刺日夜不止

牡丹

乾薑

炮剉

桂心

紫葛

剉

赤芍藥

當歸

剉炒

赤箭

各半兩

延胡索

蜜蟲

炒黃

水蛭

炒黃

買子木

枳

殼

去瓢炒

白薑蠶

炒

地龍

炒各一錢

右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓

每於食前溫服

穿山甲散

出聖惠方

治婦人經脉不通一月至三箇月腹內

有氣塊發來從脇下起衝心是鬼胎

穿山甲

三錢炙

牡丹

肉桂

去皮各半兩

鬼臼

去毛

驢護肝

蒲黃

各一兩

當歸

三錢酒炒

蓮子

一兩

川大黃

半兩炒

桃膠

三錢

檳榔

錢一

右搗篩為散每服三錢以水酒各半盞煎至六分去

滓食前溫服

雄黃丸

出聖惠方

療妊娠是鬼胎致腹中黑血散下腹痛

雄黃

細研

鬼白

去毛

莽草

丹砂

細研

巴豆

去皮

心并油

獺肝

炙半兩

兩 蜥蜴

炙一兩

蜈蚣

一條炙黃

右為細末蜜丸如桐子大空心溫酒下二十九日二

服後當利如不利加至三十九初下清水次下蟲如

馬尾狀無數病極者下蛇蟲或如假卵雞子或如白

膏或如豆汁其病即除

治鬼胎如抱一甕

出危氏方

茱萸 川烏 秦艽 柴胡 白殭蠶

直者洗

巴戟

生用 巴豆

去殼不去油

芫花

酒煮各一兩

右為末蜜丸如桐子大每服七丸蜜酒吞下取出惡物

即愈

治婦人鬼胎及血氣不可忍

出聖惠方

班貓

去頭翅
足製

延胡索

炒各
三枚

右為細末再研如麵以溫酒調下半錢以胎下為度

治婦人虛羸有鬼胎癥塊經候不通

出聖
惠方

用芫花根三两剉炒令黃色為細末每服一錢桃

仁煎湯調下當下惡物

治婦人經脉不通癥塊脹滿腹有鬼胎方

出聖
惠方

用葛上亭長五枚以糙米相和炒令熟去翅足礮
為末分三服空心煎甘草湯調服須臾覺臍腹急

痛煎黑豆湯服之當通

下胎 附論

夫妊娠羸瘦或挾疾病臟腑虛損血氣枯竭既不能養胎致胎動而不堅固終不能安者則可下之免害妊婦也 妊娠因染溫疫傷寒邪毒之氣入於胞臟致令胎死候其當胎處若冷為胎已死可下之也

方

催生湯

出三方因方

治產婦陣踈難產經三兩日不生或胎死腹

中或產母氣之委頓產道乾澀纔覺陣痛破水便可投之

蒼朮

甘浸洗
炒二兩

苦梗

一兩
陳皮六錢

白芷

桂心

甘草

各三錢

川芎

一錢半

川烏

當歸

酒浸
炒

乾薑

炮
厚朴製

芍藥

茯苓

半夏

湯
附子

炮去
皮臍

南星

炮各
二錢

枳殼

四錢
炒

木香

一錢
杏仁

去皮
尖炒

阿膠

炒各
一錢

右細末每服一大錢溫酒調下覺熱悶加白蜜新汲水調下只是五積散無麻黃有川烏附子南星阿膠木香杏仁六味

蟹瓜散

出聖惠方

療羸人欲去胎不能安

甘草

炙

乾薑

人參

去蘆頭

芎藭

生薑

桂心

蟹瓜

黃芩

各一兩

右㕮咀以水七升煮取二升分三服忌海藻松菜生

葱一方加牛膝

治婦人兩月孕身要行取動者

枇杷葉

去毛淨

烏尖

何首烏

紅花

麝香

當門子研

當歸

硃砂

各等分

右為細末空心溫酒調下

療去胎

出大全良方

括蔞

四兩桂心

五兩牛膝

三兩瞿麥二兩

右切以水七升煎二升五合去滓分三服別如人行八九里進之無忌

治動胎及產難子死腹中并姙娠兩兒一死一生服之

令死者出生者安

方見損胎類蟹瓜湯

下死胎方

一名香桂散出本事方

桂

末二錢

麝香

當門子一箇

右同研為末煖酒服須臾如手推下比之用水銀等此藥不損血氣

治婦人兩月孕身要行取動者

對節草

一握

牛膝草根

一握

右入蘇木好酒封瓶口火溫早晨服二朝方入狗骨灰一大錢酒調下便行

治妊娠胎動不可安者宜下之

出聖惠方

杏仁

二十枚 去皮尖炒

桃仁

十七枚 去皮尖

桂心

末一錢

右用多年鹽梅肉和丸如梧桐子大每十九溫酒下

未下再服

治臨月損動不可安

出聖惠方

斷弓弦

二寸 燒灰

箭筈

一枚 燒灰

右合研令細以清水調頓服之

治妊娠得病須去胎方

出大全良方

用雞子一枚鹽三指撮和服之立下

又方

出聖
惠方

用麥蘖一升為末和蜜一升服之立下一方用麥
蘖二兩水一盞半煎一盞分溫三服

又方

出大全
良方

用大麥麴五升酒一斗煮三沸去滓分五服令盡
當宿勿食其子如糜令母肥盛無疾苦一方用神
麴酢煮或水煎服之亦得下須七月七日神麴佳

療母困篤恐不濟去胎

出聖
惠方

用蝨蟲十枚搗為末酒服之即下

妊娠或以不治欲下胎

出肘後方

用斑猫燒末服一枚即下

治妊娠或以不理欲去胎

出肘後方

用守宮肝蛇脫皮以苦酒和摩塗臍上及左右令

溫胎即下

療去胎

用牛膝六七莖綿纏槌頭令碎深納至子宮忌生

葱猪牛肉

治姙娠未足月胎死不出

出肘
後方

用醋煮大豆取汁服三升死兒立便分解未下再服一方以醋一升格口灌之亦妙

治姙娠子死腹中

用雄鼠屎二七粒以水三升煮取一升去滓取汁以作粥食之胎即下

治姙娠熱病胎夭腹中下之方

出聖
惠方

用益母草搗絞取汁服一中盞立效

牛膝湯

出聖惠方

療妊娠胎動安不得子尚在腹母欲死須

以此藥下之

牛膝

去苗剉半兩

水銀

二兩朱砂二兩半研

右以水五大盞煮牛膝可得一半去滓即以蜜和朱
硃及水銀研如膏每服以牛膝汁一小盞調下半匙服
桂心散 治妊娠母因疾病胎不能安可下之

桂心

瓜蒌

牛膝

瞿麥

各二兩

當歸

一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心去滓服一方
有蟹瓜二合

又方

瞿麥 桂心

各一兩

牛膝

二兩

蟹瓜

二合

右為末空心溫酒調二錢服

又方

用牛膝一握細搗以無灰酒一大盞煎取七分溫二服
療下死胎方

用風化朴硝入硃砂同研如桃花色童便下宜下死胎

又方

以清油和蜜等分入湯頓服

又方

用蜀葵子炒末酒湯任下

又方

以右手持馬銜鐵左手持石燕一對合手坐死胎即下

又方

用新汲水濃磨京墨服

又方

吞雞子清一箇諸方亦治死胎

治胎死得效方

以鹿角屑二三方寸匕煮蔥豉湯和服之立出

治妊娠胎死腹中若胞衣不下上迫心

用墨三寸末酒服之

治妊娠胎死腹中若胞衣不下上搶心及產不出者

用瞿麥一把水五升煮二升汁服

下死胎

用芫薺子作煎及搗取汁服之

半產

附論

夫妊娠日月未足胎氣未全而產者謂之半產蓋由妊婦衝任氣虛不能滋養於胎胎氣不固或擲撲閃墜致氣血損動或因熱病溫瘥之類皆致半產仲景謂寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下是也 又云半產俗

呼曰小產或三四月或五六月皆為半產以男女成形故也或因憂恐暴怒悲傷太甚或因勞力打撲損傷及觸冒暑熱慎勿用黑神散以其犯熱藥恐轉生他疾止宜用玉燭散和經湯之類便產湏知云小產不可輕視將養十倍於正產可也又云半產即肌肉腐爛補其虛損生其肌肉益其氣血去其風邪養其臟氣將養過於正產十倍無不平復宜審之耳

方

安宮散 治妊娠不滿月小產安胎如神

黑附子

炮

阿膠

粉炒

北五味

山藥

黃耆

炙

當歸

熟地黄

赤芍藥

木香

甘草

炙各一錢

糯米

炒

生薑

半兩炒

右剉末每服五錢苧根三寸水一盞半煎一盞通口

服忌生冷

補中湯 養新血去瘀血補虛扶危治月未滿半產

乾薑

炮

阿膠

剉蛤粉炒

芫薺

五味子

各一兩

白朮

黃土炒

黃耆

去蘆
蜜炙

當歸

去蘆
酒浸

赤芍藥

各一
兩半

人參

木香

不見

火

杜仲

去皮
炒

甘草

炙各
半兩

右劉散每服四錢水一盞半煎通口服不拘時候

生地黃湯

治妊娠胎氣損動氣血不調或癰撲閃墜

因致墮胎謂之半產及產後氣血不和惡滯不盡腹

中疴痛

生地黃

焙一
兩

大黃

畧
煨

芍藥

白茯苓

去
皮

當歸

切酒
炒

細辛

去
苗

甘草

炙

黃芩

去
心

桂

去皮
半兩

右咬咀每服五錢以水一盞半入生薑一棗大拍碎同煎一盞去滓不拘時溫服

人參湯 治半產後血下過多心驚體顫頭目運轉或寒或熱臍腹虛脹疼痛

人參 麥冬去心生地黃焙當歸切炒芍藥 黃耆剉

白茯苓去皮甘草炙各一兩

右咬咀每服三錢以水一盞煎七分去滓食前服

芒硝飲 治半產後惡露不盡氣攻疼痛血下成塊結

築臍腹煩滿悶亂

芒硝

蒲黃 芎藭

桂

去皮不見火

鬼箭羽

各半兩

生

地黃

焙一兩

桃仁

去皮尖炒半兩

右㕮咀每服三錢以水一盞煎七分去滓不拘時溫服一方有人參無鬼箭羽名蒲黃湯

艾葉湯

治半產惡露不斷心悶氣短

方見本門諸血類

延胡索湯

治半產後氣血不快惡露斷續

延胡索

當歸

切炒

芍藥

芎藭

桂

去皮

甘草

炙各一兩

右咬咀每服三錢以水一盞煎至七分去滓不拘時

溫服

奪命丸

出簡易方

專治婦人小產下血至多子死腹中其人

增寒手指唇口爪甲青白面色黃黑或胎上搶心則
悶絕欲死冷汗自出喘滿不食或食毒物或誤服草
藥傷動胎氣下血不止胎尚未損服之可安已死服
之可下

牡丹皮

白茯苓

桂心

桃仁

製

赤芍藥

各等分

右為細末以蜜丸如彈子大每服一九細嚼淡醋湯送下連進兩丸至胎腐爛腹中危甚者立可取出

羚羊角飲 治半產後心煩悶倦

羚羊角屑半兩芍藥兩一枳實去瓢麩炒三錢人參兩一麥冬去心焙半兩

右㕮咀每服三錢以水一盞煎至七分去滓不拘時溫服

旋覆花湯出金匱方治婦人半產漏下

旋覆花三兩葱十四莖新絳少許

右以水三升煮取一升頓服之

香豉湯

出千金方

治半產下血不盡苦來去煩滿欲死

用香豉一升半以水三升煮三沸漉去滓內鹿角末一方寸匕頓服之須臾血自下鹿角燒亦得

治小產惡露淋瀝不斷將近月餘諸治不效

出便產須知

用五靈脂炒微焦為末飯糊為丸如桐子大米飲吞下三十九或四十九亦可應手而效一方用酒亦可

全生活血湯

出蘭室秘藏方

治婦人分娩及半產漏下昏冒不

省瞑目無所知覺蓋因其血暴下暴亡有形血去則心神無所養心與胞絡者君火相火也得血則安亡血則危火上熾則令人昏冒火乘其肺瞑目不省人事是陰火暴去不能鎮撫令血虧損也往往用滑石甘草石膏之類乃辛甘太寒之藥能泄氣中之熱是血虧瀉氣乃陰虧瀉陽使二者俱傷為不足虛勞人也昏迷不省者上焦心肺之熱也此無形之熱用寒

涼之藥驅令下行豈不知上焦之病悉病於表乃陰證也汗出則愈今反下之幸而不死暴虧氣血生命豈能久活又不知內經有說病氣不足宜補不宜瀉但瞑目之病悉屬於陰宜汗不宜下又知傷寒鬱冒得汗於是禁用寒涼藥也分挽半產本氣不病是暴去其血亡血補血又何疑焉補其血則神昌常時血下則亡今當補而升舉之心得血而安神不昏矣血若暴下是秋冬之令大旺能舉而升之矣助其陽則

目開神不昏迷矣今立一方補血養血生血益陽以
補手足厥陰之不足名曰全生活血湯

蔓荊子 藁本 羌活 獨活 升麻 葛根

白芍藥

甘草

炙

柴胡

去苗

當歸身

酒洗

生地黄

夏月加之

熟地黄

炒

川芎

防風

二錢

諸陽既陷何以知之血下脫故也

細辛

高良薑

一錢

乾薑

一錢

附子

一錢

燭稍

半錢

炒鹽

二錢

黃蘗

少許為
引用

右為麤末每服五錢水五盞煎至一盞去滓稍熱服

或為細末酒麵糊為丸亦可

又方

出東垣
試效方

治論同前

柴胡

二錢

當歸身

酒製
二錢

生地黄

一錢夏
月加之

熟地黄

一錢
炒

川芎

一錢
半

防風

二錢

諸陽下陷何以知
之血下脫故也

細辛

蔓荊子

各五
錢

藁本

一錢
半

羌活

獨活

各二
錢

升麻

三錢

白芍藥

三錢

炙甘草

二錢

紅花

三錢

右咬咀如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去滓

稍熱服食前

延齡散

出大全良方

治半產後補虛生肌肉平復正氣

桑寄生

當歸

石斛

川芎

乾地黄

續斷

牛膝

各半兩

人參

澤蘭

獨活

防風

木香

五味子

細辛

官桂

不見火各一兩

右為細末每服三錢空心入鹽煎服或煉蜜丸如桐子大空心鹽湯任下五十丸更妙也

治半產出血過多不可禁止忽氣悶不識人宜服此方

出護命方

吳茱萸

錢三石斛去頭

當歸各半兩

續斷 蒼朮

黃耆

防風

牡蠣

煨火

川芎

厚朴

去皮薑製

龍骨

炙艾葉

獨活

各一錢

右為細末每服五錢水一盞半煎至一盞三分入棗二枚同煎空心去滓服若血過甚蜜為丸如桐子大空心鹽米湯下三十丸只進一兩服蓋此藥不可服滓也服此藥數日後血止長服補虛散子

治胎死腹中半產不下

出護命方

官桂

去皮一兩

牡丹皮

去心

芎藭

葵子

各一兩

右細羅為末每服五錢濃煎葱湯調下

治一切婦人半產後損傷正氣不能將養經兩三月惡

露不止面色黃瘁喫食減少無力臟腑虛冷

出護命方

當歸

一兩艾葉

川芎

細辛

木香

防風

各一兩

牡蠣

火煨續斷

石斛

桑寄生

各半兩

右為細末每服二錢水一盞煎三四沸空心去滓服

治一切婦人忽因半產正產之後將養不到血氣傷損

經候過多面色青黃非時瀉痢喫食減少肌肉稍瘦
腹內氣痛衝心刺脇乍寒乍熱下部無力耳立肩竦
眼色變異將成勞候宜服此方

出護
命方

當歸 五味子 牛膝 白芷 獨活 乾地黄

蓬莪朮 防風 巴戟心去 石斛 延胡索 官桂

去皮細辛去葉醋炙鼈甲炙木香 草薢 藁本各一錢

右為細末煉蜜丸如桐子大早朝空心鹽湯下五十

丸

墮胎 附論

夫胚胎之始賴血氣以滋育若妊娠血氣盛強陰陽之至相和與流薄於一體唯能順時數謹人事勿動而傷則生育之道得矣若衝任氣虛將攝失宜子臟風冷不能滋養於胎故每有姙則數致傷墮也 夫陽施陰化故得有胎榮衛調和則經養周足故胎得安則能成長若血氣虛損者子臟為風寒所苦則血不足故不能養胎所以數墮胎也其妊娠腰痛者善墮胎也夫墮胎後

腹損於經脉經脉既虛故下血不止也下血多者便致煩悶乃至死矣 又云戴仁過東杞一婦人病大便秘結小便淋瀝半生不娠惟常服疎導之藥則大便通利暫廢藥則結滯忽得胎至四五月間醫者禁疎導之藥大便依常為難臨產則力努為之胎墮凡如此胎墮者三又孕已經三四月弦望前後便溺結澁甚恐胎墮乃訪戴仁戴仁診其兩手脉俱滑大脉雖滑大以其且妊不敢陡攻遂以食療之用紅花黃芩蒺藜葵菜以車前子

苗作茹雜猪羊血作羹食之半載居然生子其婦燥病
方愈戴仁曰余屢見孕婦利膿血下迫極勢損胎但同
前法治之愈者莫知其數也為醫拘常禁不能變通非
醫也奈舉世識醫者鮮是難說也

方

白薇丸 治婦人血海冷慙不能養胎妊娠數墜

白薇

去蘆牡丹皮剉

熟乾地黄

焙

木香

不見火

當歸

切焙

肉豆蔻仁

遠志

去心附子

炮製去皮臍

禹餘糧

火煨

醋淬五七

遍別研

石膏

別研各二兩

獨活

去蘆切

吳茱萸

湯洗七遍去滑焙各一兩

蜀椒

去目并開口炒出汗半兩

黃耆

剉微炒

五味子

微炒桂去粗皮各三錢

芎藭

一兩

肉蓯蓉

酒浸去皺皮切焙二兩

白茯苓

去黑皮

細辛

去苗

葉各

一兩

右除別研外搗羅為細末入研料藥拌勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫酒下空心食前

卷柏丸

出聖惠方

療妊娠數墮胎皆因氣血虛損子臟風冷

致胎不堅因頻有所傷

卷柏 鍾乳粉 鹿角膠炒 紫石英飛 桑螵蛸炒

禹餘糧煨研 陽起石飛 桂心 川牛膝 桑寄生

北五味 熟地黃各一兩 牡丹皮 杜仲 川芎

當歸各三錢 蛇床子

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三四十丸空心

溫酒吞下

紫石英丸

一名紫石英天門冬丸出聖惠方

主風冷在子宮有子長落

或始成娘便患心痛乃成心疾月水多未曾來服之

肥悅令人有子

紫石英 天門冬去心 五味子各三兩 烏頭炮 卷柏

烏賊魚骨 雲母燒研 禹餘糧 當歸 川椒如常製

桑寄生 石楠葉各一兩 澤瀉一作澤蘭 杜仲 遠志去心

肉苁蓉 桂心 甘草 石斛 人參 辛荑一作

藟栢子仁各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大溫酒下二十九至三四

十九

杜仲丸 治子宮久冷妊娠數墮胎

杜仲

去粗皮炙劉

防風

去叉

附子

炮製去皮臍

石菖蒲

桔梗

炒

秦朮

去苗土

細辛

肉桂

去粗皮

厚朴

去粗皮生薑汁炒

半夏

湯浸二七遍焙各三錢

沙參

熟地黄

焙

蜀椒

去目并開口者炒出汗

乾薑

炮各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下十五丸
漸加至二十丸一月見效

紫石英丸 治血氣不足臟中挾寒妊娠數墮

紫石英

椎作丹塊以葵菜煮半日研細水飛

當歸

切焙鹿茸

切片酒浸一宿去毛炙

禹餘糧

火煨醋淬七遍水飛

枳殼

去瓢炒

芫花

各一兩

側柏

微炒

細剉醋拌炒黃

桂皮

去粗

赤芍藥

阿膠

蛤粉炒黃去粉

白芷

各三錢

烏賊魚骨

去甲微炙

木香

各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒下

空心晚食前各一服

地黃丸

治婦人血氣衰弱子臟風冷妊娠數墮

熟乾地黃

新潤者焙一兩

澤蘭

嫩者

山芋

石斛

沉水者

厚朴

去粗皮生薑汁炙令透

肉蓯蓉酒浸切焙蛇床子炒

柏葉艾者

續斷

卷柏

湯浸洗

五味子

各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每日空心晚間生薑

艾湯下十五丸

補益調中散 治婦人曾傷三月四月胎

芍藥

剉當歸

切焙乾

厚朴

去粗皮生薑汁炙

續斷

芎藭

剉炒

白朮

剉柴胡

去苗

桑根白皮

生剉焙乾

烏梅

去核

枳殼

去瓢炒

各一兩

右咬咀每服五錢以水一盞半煎八分去滓溫服

乾地黄散

一名黃耆散
出聖惠方

治妊娠數墮胎子宮虛冷寒熱

百病

熟乾地黄

黃耆

剉

芎藭

白朮

人參

當歸

切焙各
一兩

乾薑

炮

甘草

炙

吳茱萸

湯洗七遍焙乾
微炒各半兩

右為細散每服二錢食前溫酒調下忌海藻松菜蕪

菱桃李雀肉等

阿膠湯

治妊娠數墮胎小腹疼痛不可忍

阿膠

炙令燥

熟乾地黄

焙乾切

艾葉

微炒

芎藭

當歸

焙切

杜仲

去皺皮炙到

白朮

各一兩

右咬咀每服四錢以水一盞半棗三枚擘破同煎至

八分去滓食前溫服

地黄湯

治妊娠血氣衰微胞臟挾冷數墮胎

乾地黄

熟者四兩

當歸

焙切

艾葉

各一兩

芎藭

阿膠

炒令燥

杜仲

去粗皮剉炒

五加皮

各三兩

右剉如麻豆大每服五錢以水一盞半煎至一盞去

泔溫服空心食前服之

吳茱萸湯

一名實胎散
出便產須知

療妊娘懷胎數落而不結實或

冷或熱百病之源

甘草

炙

黃耆

人參

川芎

白朮

熟地黃

洗
蒸

吳茱萸

各等
分

右為末空心溫酒調下二錢忌菰菜桃李雀肉醋物

吳茱萸丸

治子宮久冷妊娘數墮胎

吳茱萸

湯洗六
七遍

蜀椒

去目及開口者
炒出并各三兩

高良薑

洗切
焙

附子

炮製去皮
臍各一兩

白朮

二兩
青橘皮
湯洗去白麩
炒黃一兩半

右為末用乾柿二十枚以清酒浸令軟研膏和搗得
所丸如梧桐子大每服十九至十五丸空心臨卧溫
熱水下

茯苓散 治胎月未足氣血未充輒墮胎血傷動下不
止虛損困倦

白茯苓

去黑皮

人參

黃耆

薄切

酸石榴皮

切炒

陳橘皮

去白

甘草

炙各
一兩

右為細散每服二錢以熱酒調溫服米飲亦得不拘時候

桑寄生湯

出聖惠方

治妊娠胎動數損墮止痛安胎逼心煩

悶欲絕

桑寄生

當歸

切焙

芎藭

人參

甘草

炙等分

右咬咀每服四錢以水一盞入葱白七寸同煎至六分去滓溫服

芎藭湯

治妊娠數墮胎心腹疼痛

芎藭 芍藥

白朮

阿膠

炒令燥

甘草

炙各一兩

右咬咀每服三錢以水一盞入艾葉糯米生薑同煎至六分去滓食前服一方無白朮有人參

治妊娠數墮胎方

出聖惠方

用赤小豆為末酒服方寸匕日二服亦治妊娠數

月月水尚來

捷徑方

出大全良方

治婦人服草藥墮孕腹痛

用白扁豆生去皮為細末米飲調服方寸匕若脩

製不及濃煎服亦可亦解男子女人誤中砒毒亦
治婦人赤白帶下炒黃為末米飲調下一方用新
汲水調服治用毒藥攻胎藥毒攻心外證牙關緊
急口不能言兩手強直握拳頭低自汗身微熱外
證與中風相似但其脉浮而軟十死一生醫多不
識若作中風治之必死無疑

治婦人懷妊多墮方

出華佗
中藏經

熟艾

五斤洗
淨焙乾

米醋

三升煮炒
乾焙為末

大赭石

二兩米醋淬
五七遍用

木鼈子

五箇
研細

右為末煮棗肉為丸梧子大每服三十九米飲下

吳茱萸湯 治妊娠數落而不結實或冷或熱

黃耆

一兩

吳茱萸

半兩
湯洗

甘草

炙一兩
半

芎藭

一兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下

墮胎後心痛方

出肘
後方

豉三升生薑

五兩

葱白

十四
莖

右以酒六升煮取三升分三服瘥

墮胎方

出本草

以白商陸大蒜服之

治落胎

出本草

用苦耽苗子煮汁服亦生搗絞汁服

墮胎後衣不出

附論

夫胎氣內動不能自安非時而墮既墮而胞衣不出者以衣帶尚與母氣相屬血氣猶固傷墮之次復加風冷血氣凝澁遂致衣不出治法宜以破血溫氣之劑墮

胎胎初下後婦人血羸不能更用氣力產胞也便遇外冷則血凝故胞衣不出也

方

當歸湯 治妊娠墮胎胞衣不出

當歸

切牛膝酒浸切焙各一兩半

木通

剉

滑石

碎各二兩

冬葵子

炒一合 瞿麥穗一兩

右㕮咀每服三錢以水一盞半煎至八分去滓溫服未下再服以下為度

牛膝散

出聖惠方

治妊娠五六月墮胎胞衣不出

牛膝

去苗

芫薺 川朴硝

蒲黃

各三錢

桂心

半兩去粗皮

當歸

一兩半

右㕮咀每服四錢以水一中盞入生薑半錢生地黃一錢煎至六分去滓放溫頻服效

冬葵子湯 治妊娠墮胎胞衣不出

冬葵子

炒

牛膝

酒浸切焙

木通

剉各二兩

瞿麥穗

一兩

桂

去粗皮二兩

右㕮咀每服二錢以水一盞半煎至八分去滓溫服

以下為度

阿膠湯 治妊娘墮胎胞衣不出

阿膠

炙令燥

冬葵子

炒

牛膝

酒浸切焙

當歸

切焙各三錢

右咬咀每服三錢以水一盞半煎至八分去滓溫服
以下為度

雄黃散 治妊娘墮胎胞衣不下昏悶喘急者宜急救

雄黃

研

香墨

研各一錢

金箔

三片

馬牙硝

一錢研

右研勻每服一錢以蜜少許與溫湯調服未下更服

蒲黃散

出聖惠方

治墮胎胞衣不出腹中疴痛牽引腰脊

蒲黃

三錢

桂心

赤芍藥

各一兩

牛膝

二兩去苗

右㕮咀每服四錢以水酒各半盞煎至六分去滓溫服

地黃酒 治姙娠墮胎胞衣不出

生地黃

以銅竹刀切炒半兩

蒲黃

炒

生薑

切炒各一錢

右㕮咀以無灰酒三盞於銀器內同煎至二盞去滓分溫三服未下更服

澤蘭湯 治妊娠墮胎胞衣不出

澤蘭葉

切碎

滑石

末各半兩

生麻油

少許

右以水三盞先煎澤蘭葉至一盞半去滓入滑石末并油更煎三沸頓服之未下更服

蒲黃酒

一名槐子丸
出大金良方

治妊娠墮胎胞衣不出

蒲黃

炒一合

槐子

十四枚
為末

右以酒三盞煎至二盞去滓分溫二服未下更服一方治妊娠月數未足欲產腹痛用蜜丸溫酒下

治墮胎胞衣不出腹中疔痛牽引腰脊

出聖
惠方

用蟻窠土三升炒帛裹搗心下胞自出也

又方

出聖
惠方

用好墨細研每服以溫酒調下二錢頻服效

治妊娘胎死腹中胞衣不出及產後卒有別病欲至狼

狽方

出聖
惠方

用刺熟羊血飲一小盞極效

又方

出聖
惠方

用水嚙其面神驗用醋少許

又方

出聖惠方

用洗兒水半盞令母服其衣便出勿令產婦知

又方

出聖惠方

若胞衣未下腹滿則殺人

用水一盞煮猪脂一两煎五七沸和脂服之當下

治胎衣不下

用蛇退皮炒焦為末酒調下如胎衣在腹另碾榆

白皮末同煎服立下

治胎衣不下

用草麻子十四枚去殼止裏貼足下男左女右衣

下即去

又方

出如
宜方

以雞子一箇取清吞之

又方

出如
宜方

用鐵斧燒令通紅投酒中沸定則出飲之

墮胎後血不出

附論

夫血性喜溫而惡寒溫則宣流寒則凝澀妊娠墮胎惡血不出者由妊娠宿有風冷在於胞臟冷搏惡血故令不下令人寒熱去來臍腹滿痛口乾燥渴手足若煩若血隨氣逆上衝於心或語言狂妄或迷悶不省至其病變不可勝數宜速以破血下氣藥治之血下乃已

方

琥珀煮散 治妊娠墮胎後惡血不出小腹疼痛

琥珀

研一錢

沒藥

研

蒲黃

當歸

去苗切焙

赤芍藥

炒

薑黃 紅藍花 土瓜根 牛子李 延胡索

牡丹皮

各半兩

右為散每服三錢以童子小便酒各半盞同煎至七分溫服心腹脹痛溫酒調下二錢

鑑鼻湯 治妊娠墮胎後血露不出心腹疼痛

銅鑑鼻

別搗細研如粉

大黃

劉微炒

生乾地黃

微炒

芍藥

各一兩

甘草

炙劉

芎藭

乾漆

炒去烟各一錢

棗

七枚去核焙

亂髮

雞子大燒灰

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓投入芒硝

少許再煎一二沸溫服相次更服

大黃飲 治妊娘墮胎後血不出腹中疴痛不可忍

大黃

劉炒

芍藥

黃芩

去黑心

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒黃色

當歸

微炙各

桂

去粗皮

甘草

炙赤各三錢

生乾地黄

焙一兩半

右㕮咀每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服食

頃再服

牡丹丸 治妊娘胎後血不出寒熱腹痛

牡丹皮

當歸

炙令香剉

芍藥

白朮

鬼箭羽

桂

去粗皮
各一兩
大黃
剉炒
三錢

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十九溫酒時時一服漸加至三十九

大黃湯 治妊娠墮胎後血不出

大黃
剉炒
當歸
微炙

甘草
剉炙
吳茱萸
剉

湯洗
炒黃
牡丹
去心切

芍藥
各一兩

右咬咀每服三錢以水一盞生薑一錢拍破同煎六分去滓溫服相次再服

桃仁湯 治妊娠墮胎後血不出往來寒熱腹痛

桃仁

湯浸去皮尖雙仁
麩炒黃色二十枚

吳茱萸

湯洗炒
黃二兩

當歸

微炙
剉

黃耆

微炙
剉

芍藥

各一兩

醍醐

二兩

右除醍醐外麤搗篩每服三錢以生薑一錢拍破水
一盞酒半盞煎至六分去滓下醍醐半兩攪勻溫服

紅藍花散

治妊娠墮胎後血不出奔心悶絕不識人

紅藍花

微熬
過

男子髮

燒灰
研

墨

燒通
紅

騏驎竭

研

蒲黃

隔紙炒
各一兩

右為散以童子小便三四分調二錢服之立瘥

烏金散 治妊娠墮胎後惡血不出四肢無力體熱心
胃滿煩悶及諸疾血病

墨

二兩打折二寸挺子燒通赤用好醋一升醺七遍再燒通赤放冷別研為末

沒藥

研

騏驎竭

各一錢 麝香

錢一

右為細散每服溫酒調下一錢如血迷心用童子小
便和酒調下二錢

猪膏飲 治妊娠墮胎後血不出上搶心痛煩憤

猪膏

七合

白蜜

三合

生地黄

切二兩

右先将猪膏地黄相和煎令赤色去却地黄内蜜三合攪匀分温二服相次再服

白蜜湯 治妊娠墮胎後惡血不出

白蜜

二兩

生地黄

汁一盞

酒

半盞

右將地黄汁與酒於銅器中煎五十七沸入蜜攪匀分作兩服放温相次再服服二劑百病可愈

治妊娠墮胎後敗血不出

墨

三兩用炭火燒紅以醎醋淬如此三遍以沒藥

燒瓦掬於淨地上合令冷取出細研如粉

一兩別研末

右合研令極細再羅過每服二錢正以煎醋調下不

拘時

當歸酒 治妊娠墮胎後血不出

當歸

炙令香剉

芍藥

剉炒各二兩

右咬咀每服三錢正以無灰酒一盞入生地黃汁一

合於銀器內慢火煎至七分去滓溫服以惡血下為度

治妊娠墮胎後血不出小腹滿痛

用羚羊角燒灰細研如麩每服三錢正不計早晚
以豆淋酒調下

墮胎後血出不止

附論

夫胎不安而墮既墮而血出不止者以調養不周血緣
虛出甚則心神煩憤乃至昏冒也 墮胎後腹損於經
脉經脉既虛故下血不止便致煩悶乃死矣

方

桑根煎丸 治妊娠墮胎後血出不止胃脇心腹滿痛

時復寒熱甚者

桑根白皮

剉二兩

麻子仁

淨洗五合研

清酒

五盞煮煎二味藥至三盞

絞汁

棗

三十枚大者取肉

飴糖

二兩

阿膠

炙令燥一兩

蜜

五大合取棗糖

膠同煎一大盞如膏

乾薑

炮製厚朴

去粗皮生薑汁炙七遍剉碎各半兩

芍藥

半兩

蜀椒

去目并合口者炒出汗

肉桂

去粗皮

甘草

炙令赤

黃蘗

剉碎炒

生乾地黄

焙

玄參

五味子

各一錢

右以先七味共煎成稀膏以後十味為末與前膏同

和為劑塗酥更搗令勻熟丸如彈子大以溫酒下一

九食前服

地榆散

出聖惠方治妊娠損胎下血不止腹內疼痛

地榆

三錢剉

乾薑

一錢炮裂剉

當歸

三錢剉微炒

龍骨

三錢芫莢

艾葉

半兩微炙

阿膠

三錢搗碎炒令黃燥

熟乾地黄

一兩兩蒲黃三兩

牛角鰓

一兩燒灰

白朮

半兩

烏賊魚骨

三錢燒灰

右為細散不計時候以粥飲調下二錢

當歸散

出聖惠方

治妊娠損胎後下血不止

當歸

三錢 剉 微炒

龍骨

三錢 剉 錢地榆

五錢 剉

艾葉

兩 半 阿膠

三錢 搗碎

炒令
黃燥

牛角鰓

一兩 燒灰

熟乾地黄

三錢 錢芩

三錢 白芍

兩 半 兩 炒

乾薑

半兩 炮 剉

黃耆

半兩 剉

柏葉

三錢 微炙

右為細散不計時候以粥飲調下二錢

龍骨散

一名當歸散 出聖惠方

治妊娠墮胎後血出不止腹痛并

損動

龍骨

半兩 炮

生乾地黄

焙

地榆

去苗細剉 各一兩半

芍藥

各一兩

乾薑

炮
紫蒲黃

微炒

阿膠

炒令

牛角鰓

取黃牛角內者炙令 白焦錯取末各半兩

艾葉

一錢
為末

右為細散每服二錢以前生乾地黃酒調服米飲調服亦得忌生冷油膩猪肉魚蒜蕪荑

地榆散

治妊娠墮胎後血出不止

一名龍骨散

地榆

去苗到
碎一兩

當歸

切焙龍骨

艾葉

搗成
末

蒲黃

微炒各
半兩

牛角鰓

炙令勻焦錯取別
研一作犀角屑

阿膠

炒令
燥

生乾地黃

焙各

一兩一方用

熟乾地黃

右為細散研勻每服二錢以溫米飲粥調食前服

當歸散 治妊娘損胎後下血不止

當歸

三錢 剉

熟乾地黄

一兩

鹿茸

三錢 去毛 塗酥炙

白膠

一兩 搗碎

炒令
黃燥

艾葉

半兩 微炒

甜葶藶根

三錢

附子

半兩 去皮臍

黃芩

半兩

右為細散每於食前以粥飲調下二錢

白膠散 治妊娘三兩月後或時傷損下血不止遠臍

疼痛吐逆悶絕

白膠

二兩 搗碎 炒令黃燥

人參

去蘆 頭

半夏

湯洗七遍 去滑

秦艽

去苗 切

紫苑

甘草

炙微赤 剉 各一兩

右呖咀每服三錢以水一中盞入葱白二莖煎至六分去滓不計時候溫服

地榆湯 治妊娠墮胎後血出不止形體虛羸

地榆

去苗刮淨
細剉一兩

當歸 炙焙切
碎二兩

生薑

去皮切碎
陰乾者

艾葉

搗為末
各半兩

赤石脂

一兩

右呖咀每服三錢以水一中盞入新竹葉十片同煎至七分去滓食前溫服一方為末淡竹瀝調下二錢

地黃湯 治妊娠墮胎後血出不止小腹滿痛

方見安胎類

葱豉湯

治墮胎後心痛

方見前治妊婦諸病類

榆白皮煮散

治妊婦墮胎後血出不止

榆白皮

刮淨剉碎

當歸

切焙各半兩

右咬咀每服三錢以水一盞入生薑三片同煎至七分去滓空心服

膠艾湯

治妊婦墮胎後血出不止腹痛亦療損動母

去血

艾葉

搗成末一兩

阿膠

炙令燥半兩

右以咀每服三錢正水一盞煎至五分去滓空腹服之未效更服

小薊飲 治妊婦墮胎後血出不止

小薊根葉

剉碎

益母草

去根莖切碎各五兩

右以水三大碗煮二味爛熟去滓至一大碗將藥於銅器中煎至二盞分作二服日內服盡

治妊婦墮胎後血出不止

用生地黃汁半盞調代赭末一錢必一日三五服

以瘥為度


治妊娠墮胎後血出不止

用丹參去蘆頭二兩粗搗篩每服四錢以水一盞
煎至六分去滓溫服食前一方酒煮溫服之日三
治落胎下血不止

用桑木中蝎蟲燒藥酒服方寸匕日二一方桑蝎
蟲屎燒灰服

治妊娠墮胎下血不盡苦煩滿欲極時發寒熱狂悶

用鹿角屑一兩熬以水一大盞煎鼓一合取汁六分分為三服調鹿角屑二錢服日三服須臾血下



普濟方卷三百四十三

欽定四庫全書

子部
普濟方卷三百四十五

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣李大任

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十四 明 周王朱橚 撰

妊娠諸疾門

諸血 附論

夫妊娠吐血者皆由臟腑所傷為憂思驚怒皆臟腑氣逆吐血吐血而心煩悶胃滿木欲止心悶甚者死妊娠病此多墮胎也 又云妊娠之人將護為難若觸冒風寒飲食生冷及喜怒勞動之過悉致胎動胎動則氣血

失度故下血也古方又云母有宿疾子臟為風冷所乘者亦令胎動下血皆失將護所致 又云妊娠經血暴下小腹或痛者由冷熱之氣內擊於胞絡或舉重勞煩暴傷衝任之經其血忽下隨其經養而補之所下不已腰痛者其胎多墮 又云妊娠僵仆或從高墮下傷損胞絡致血下動胎而血傷氣逆者胎墮氣上搶心其死生之候其母舌青者兒死母活唇口無沫兒生唇青沫出者母子俱死唇口赤舌青者母死兒活若下血不

佳胞絡燥胎枯則令胎死者也 又云妊娠尿血者由勞傷經絡而有熱熱乘於血血得熱則沉溢滲入於胞故尿血也

方

桔梗湯 治妊娠驚胎勞傷心腹急痛卒下血胎動不安

桔梗炒 茯神去木各一兩 人參 當歸炙剉各半兩 鈎藤皮

一錢桂去粗皮 獨活去蘆頭 芍藥剉炒各半兩 生乾地黄焙各一兩

桑上寄生微炒剉半兩 石膏一兩 甘草炙黃半兩

右麝搗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓空心

溫服日三服

陟釐丸

一名定神丸

治妊娠胎動腹痛下血宜服保胎安定

神思

方見胎驚類

桑寄生湯

一名阿膠散
出聖惠方

治妊娠胎動時有所下血腹脇

疼痛

桑寄生

一兩半

阿膠

炙燥

當歸

切焙

白茯苓

去黑皮

芎藭

白朮

乾熟地黃

焙

甘草

炙各一兩

龍骨

燒

乾薑

炮各一錢

右麤搗篩每服三錢以水一盞棗二枚擘破煎至七

分去滓不拘時溫服

阿膠散

出聖惠方

治妊娠胎動時有所下血腹脇疼痛

阿膠

三錢搗碎炒令黃燥

艾葉

半兩微炒

當歸

劉三錢微炒

赤石脂

龍骨

各半兩

芎藭

三錢

黃耆

劉

熟地黄

乾薑

炮製劉各一兩

甘草

一錢炙微赤劉

右為散每服四錢用水一盞入生薑五片棗三枚煎

至六分去滓不計時候稍熱服

半夏湯 治妊娠卒下血不止腹痛手足寒熱腰背痠疼

半夏

湯洗七遍

麥門冬

去心焙各二兩

甘草

炙

當歸

微炙

黃耆

剉各

兩阿膠

炙令燥二兩

人參

黃芩

去黑心

旋覆花

各一兩

右麗搗篩每服三錢以水一盞入蔥白二寸生薑半

錢切同煎至七分去滓空心溫服

人參湯 治妊娠卒下血致胎不安小腹疼痛

人參

當歸

切微炒

阿膠

炙令燥各二兩

甘草

炙令赤

芍藥

黃芩

去黑心

艾葉

各一兩

吳茱萸

湯洗焙

生乾地黄

微炒各二兩

右搗篩每服三錢以水一盞入生薑一棗大切同煎至七分去滓空心溫服日三

阿膠湯 治妊娠胎動腹痛下血暈悶

阿膠

炙燥一兩

生薑

切炒乾三錢

芎藭

續斷

各半兩

側柏

當歸

切焙

桑寄生

艾葉

各三錢

竹茹

雞子大一團

右麤搗篩每服三錢以水一盞入棗二枚擘破煎七

分去滓溫服之

伏龍肝湯 治妊娠胎動不安腹內疼痛下血不止

伏龍肝 桑寄生 續斷劉微炒 芎藭炒各一兩 龍骨三錢

當歸切焙 阿膠炙燥各一兩 乾薑炮 甘草炙各一兩

右麤搗篩每服五錢以水一盞半入生薑三片棗二

枚擘破同煎至八分去滓空心食前溫服

伏龍肝散出聖惠方 治妊娠胎動腹痛下血不止

伏龍肝 當歸劉微炒各一兩 龍骨三錢 阿膠一兩搗碎炒令黃燥

蒲黃三錢 艾葉半兩淨微炒 熟乾地黄一兩炒 牛角鰓炙黃燥

芎藭各半兩

右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

茯神湯 治妊娠八九月或臨月因用力勞之便即胎

動忽然下血心腹急痛面目青黑冷汗出氣息欲絕

茯神

去木

熟乾地黄

焙各一兩

甘草

炙半兩

鈎藤

一兩 桔梗 炒

人參

當歸

切焙

芍藥

剉炒各一兩半

右為麤散每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服

一方有桑寄生

禹餘糧丸 治妊娠胎動腹痛下血不止

禹餘糧

煨醋淬七遍二兩

木賊

剉炒半兩

乾薑

炮

龍骨

附子

炮裂去皮
臍各一兩

白芷

當歸

切焙

芎藭

各半兩

右為末煮麵糊和丸如梧桐子大每服三十九以溫

酒食前服之

人參飲治妊娠胎動不安腰腹痛血下不止

人參 芎藭

當歸

切焙

阿膠

炙燥各二兩

艾葉

握

杜仲

去粗皮
炙二兩

熟乾地黄

焙一兩

甘草

炙剉一兩

右粗搗篩每服五錢以水一盞半棗一枚擘破煎至

一盞去滓溫服下不拘時

阿膠散

出聖惠方

治妊娠從高墮下腹痛下血面色青黃

阿膠

一兩搗碎炒微黃燥

木香

不見火

芎藭

熟乾地黄

各半兩

乾薑

一錢炮裂剉

當歸

剉微炒

桑寄生

桂心

各半兩

右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓

不計時候溫服

膠艾湯

治妊娠卒下血胎動腹痛保血安胎

方見安胎類

蒲黃散

一名當歸散

治妊娠卒下血令胎不安臍腹撮痛

蒲黃

微炒

當歸

焙令香

龍骨

阿膠

炙令燥

芎藭

各半兩

生

乾地黄

焙各半兩一方用熟乾地黄

牛角鰓

黃牛角上者炙令焦一兩

右為散研勻細每服二錢以同煎艾煮米飲調下食

前服

艾葉湯

治妊娠卒下血不止腰腹疼痛一名地黃艾

葉湯

艾葉

炒二兩

熟乾地黄

焙二兩一方用生乾地黄

人參

地榆

乾薑

炮裂

阿膠

炒燥

當歸

切焙各一兩

右麤搗篩每服五錢以水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時候

阿膠散 治妊娘損動胎氣腹內結痛血下不止暈悶

阿膠炙桑寄生

各二兩續斷一兩半

熟乾地黄焙芎藭

白芷 人參

各一兩

右為散每服三錢煎青竹茹糯米湯調下不拘時

秦朮湯 治妊娘胎動下血身體煩熱倦怠

秦朮

去苗土

鹿角膠炙

地榆

剉

甘草

炙

白芷

人參

芎藭各半兩

右麤搗篩每服五錢以水一盞半糯米五十粒煎至一盞去滓不拘時溫服

側柏丸 治妊娠胎動臍腹痛下血不止

側柏

芍藥

各一兩

代赭石

研

黃耆

剉

木賊

剉炒

芎藭

禹餘糧

煨各半兩

右為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十九濃

煎木賊酒下食前服

芎藭散

出聖惠方

治妊娠五六箇月從高墜下胎腹內不安

兼臍下疔刺疼痛不住下血

芎藭

三錢炒

阿膠

搗碎炒令黃燥一兩

當歸

一兩剉微炒

艾葉

半兩微炒

熟乾地黄

一兩

桑寄生

赤石脂

各三錢

右搗細羅為散每服不計時候以溫酒下二錢

芎根湯

出大全良方

療勞損動胎腹痛去血胎動向下

芎根

乾地黄

各二兩

當歸

剉微炒

芍藥

阿膠

炙令黃燥

甘草

炙各一兩

右咬咀以水六升煮取二升去滓內膠烊分三服忌
海藻松菜蕪荑

杜仲湯 治妊娠卒然下血不定令胎不安小腹疼痛
連腰

杜仲去粗皮剉 人參一兩 阿膠炙令燥 芎藭各一兩 當歸

微炙 艾葉一把
二兩 焙

右粗搗篩每服三錢以酒一盞入棗三枚擘破同煎
至七分去滓溫服相次三服腹中當暖即血止一方

無艾葉止用水酒共煎服名人參湯

釣藤湯 治妊娠八九箇月或胎動不安因用力勞乏

心腹痛卒然下血面目青冷汗出氣息欲絕

方見安胎類

麥門冬湯 治妊娠胎動不安忽然下血寒熱往來腹

痛如欲產手足煩悶

麥門冬

去心焙二兩

甘草

炙對人參

生乾地黄

焙

黃芩

去黑心 阿膠

炙令燥各一兩

右為麤散每服三錢以水酒各半盞入生薑半錢切

棗三枚擘破同煎至七分去滓食前溫服

芍藥散 治妊娠胎動下血不止臍腹疼痛迷悶昏塞

白芍藥

一兩炒

牡蠣

煨半兩

熟乾地黄

煨半兩

木賊

剉炒一兩

烏賊魚骨

去甲

乾薑

炮各半兩

右為散每服三錢以米飲或溫酒調下食前

當歸散 治妊娠胎動下血不止

當歸

切焙乾

桑根白皮

剉

續斷

芍藥

芎藭

各一兩

乾薑

炮半兩

右為散每服二錢以酒調下不拘時

桑寄生散

出聖惠方

治妊娠損動腹內結痛血下暈悶

桑寄生

當歸

劉微炒各一兩

阿膠

二兩搗碎炒令黃燥

續斷

劉一兩

艾葉

半兩微炒

芎藭

一兩

右搗篩為散每服用藥五錢先以水一大盞半入銀
三兩煎至一盞次入藥并竹茹一錢糯米一百粒煎
至六分去滓食前分溫二服

卷柏散

出聖惠方

治妊娠傷動腹痛下血心煩

卷柏

阿膠

搗碎炒
令黃燥

龍骨

當歸

劉微
炒

熟艾

劉微
炒

熟乾地黄

各半
兩

右搗細羅為散每服不計時候煎黑豆湯調下二錢

黃耆湯

出聖
惠方

治妊娠五月六月血不止

黃耆

炙劉一
兩半

桑寄生

炙劉
地榆

熟乾地黄

焙各
一兩

艾

葉

焙
乾

龍骨

研各
三錢

右麝搗篩每服五錢以水一盞半生薑半錢切棗三

枚擘破同煎至六分去滓食前溫服

鹿膠湯

出仁存方

治妊娠胎動不安腰痛下血

當歸

川芎

芎根

各一兩

鹿角膠

艾葉

各二兩

右咬咀每服四錢以水一盞葱白二箇銀半兩煎至一盞去滓熱服空心食前

阿膠散

出聖惠方

治妊娠胎上逼心下血不止

阿膠

搗碎炒令黃燥

芎藭

當歸

剉微炒

熟乾地黄

各一兩

銀

一斤水一斗

煎至五升

右為散每服四錢以銀汁中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

馬通湯

出肘後方

治妊娠卒驚奔走或從高墮下暴出血數

升

馬通汁升乾地黄

阿膠

各四兩

當歸

艾葉

各三兩

右㕮咀以水五升煮取二升半去滓內馬通汁及膠

令烱分三服不瘥重作

治妊娠忽暴下血數升胎燥不動

出千金方

榆白皮

三兩當歸

生薑

各三兩

乾地黄

四兩

葵子

一升肘後不用

右以水五升煮取二升半分三服不瘥更作服之

芎藭湯

一名地黃湯

治妊娠已數月卒然下血不定

方見安胎類

芎藭散

出聖惠方

治妊娠忽胎動下惡血腹痛不可忍心神

煩悶

芎藭

一兩當歸剉微炒

鹿角膠

搗碎炒令黃燥各一兩半

桑寄生

熟乾地黄

各一兩

右為散每服四錢以水一盞入生薑五片棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

烏賊魚骨散 治妊娠胎動不安下血不止臍腹痛

烏賊魚骨

去甲一兩

白芍藥

芎藭

龍骨 赤石脂

各半兩

右為散每服二錢以米飲或溫酒調下食前

桂枝茯苓丸

治婦人宿有癥病經未及三月而得漏

下不止胎動在臍上者為癥瘕害妊娠六月動者前三月經水利時胎下血者後斷三月衃也所以血不止者其癥不去故也當下其癥

桂枝

茯苓

牡丹皮

去心 桃仁

去皮尖熬

芍藥

各等分

右為末煉蜜和丸如兔屎大每日食前服一丸不瘥

加至三九

當歸散

出聖惠方

治妊娠勞熱胎動不安下血腹痛不止手

足煩悶

當歸

劉微炒

芎藭

各一兩

黃芩

半兩炒

熟乾地黄

一兩半焙

伏龍肝

一兩

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入淡竹茹一錢煎至六分去滓不計時候溫服

乾地黄散

一名益母散
出聖惠方

治妊娠從高墜下腹痛下血煩悶

生地黃

益母草

各一兩

當歸

黃耆

各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑四片煎至六分去滓無

時候服一方加芎藭

當歸散

治妊娠卒下血腰腹痛

當歸

焙切

桑寄生

續斷

各半兩

赤芍藥

一錢

右搗羅為散每服三錢正空心食前溫酒調下有冷

加乾薑一兩腹痛加芎藭一兩

治妊娠胎動下血不住腹痛不止宜服此方

出聖惠方

當歸

劉微炒
一兩

桑木耳

微炙半
兩重

乾薑

炮裂
劉

續斷

各一
兩

右搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢

若由頓仆及舉重致胎動去血者及腹痛

出肘後方

膠

三兩
炙

當歸

二兩

甘草

一兩
炙

右咬咀以水五升煮取二升分兩服忌菰菜海藻

治妊娠注下不止

出千金方

阿膠

艾葉

酸石榴皮

各二
兩

右以水七升煮取二升去滓內膠令烊分三服

芎根湯

出三因方

治胎無故下血腹痛不可忍或下黃汁如

漆如小豆汁者

野芎根

劉金炒

銀

各一兩

右用水酒各一盞煎至一盞去滓分服不拘時候

膠艾飲

出危氏方

治妊娠忽下血胎上衝心手足逆冷欲死

生艾汁

二盞

阿膠

白蜜

各二兩

右同煎一盞半稍熱服之無生艾即濃煎熟艾一方

加竹茹一大塊同煎一兩沸分三服

治妊娠損動下血不止

出聖惠方

甘草

一兩炙可令微赤

阿膠

三兩

蚌粉

炒

右先以水一大盞煎甘草去滓次下雞子阿膠同煎

候膠消熟攪分作三服不拘時服一方無蚌粉

枳殼湯

出按萃方

治婦人胎漏下血及因事下血

枳殼

去穢麤炒

黃芩

各半兩

白朮

一兩

右為末水煎食前溫服

甘草湯 治妊娠卒下血胎動不定連腹痛

甘草

炙令赤

阿膠

炙令燥各一兩

生乾地黄

焙半兩

右麤搗篩為散每服三錢正以水一盞煎至七分去

滓溫服之良

鹿角膠湯 治妊娠胎動漏血不止

鹿角膠

炙燥一兩

人參

白茯苓

去黑皮各剉一兩

右麤搗篩為散每服三錢正以水一盞煎至七分去

滓溫服之

樓灰散 治妊娘胎動下血不止臍腹疼痛

樓櫚皮

燒灰

原蠶砂

炒各一兩

阿膠

炙燥三錢

右為散每服二錢以溫酒調下不拘時

艾葉散

出聖惠方

治妊娘胎動下血心煩悶亂

艾葉

一兩微炒

赤石脂

一兩半

白茯苓

一兩

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半錢東

三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娘胎動下血不住腹痛不止

出聖惠方

阿膠

二兩搗碎
炒令黃燥

熟乾地黄

一兩半

丹參

一兩

右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓

不計時候服

治妊娠因擎舉重物胎動疼痛兼有所下方

出聖惠方

當歸

劉微炒

黃連

去鬚

阿膠搗碎炒令黃燥各一兩

右搗細羅為散不計時候以溫酒調下二錢

治妊娠忽然下血腰痛不可忍

鹿角

劉細當歸

劉各半兩

右搗作一服以水三盞煎至一半空心食前頓服不
過二服即安

膠艾湯

出大全良方

治妊娠忽然下血腰痛不可忍及治胎

漏腹痛

阿膠

一兩炒

艾葉灰

半兩

右為末空心糯米飲調下二錢水煎服之亦得

芎藭湯

一名佛手散

治妊娠胎動下血心腹絞痛兒身死活

未必

方見安胎類

續斷湯

出聖惠方

治妊娘下血及尿血妊娘尿血者由勞傷

經絡有熱在內熱乘於血血得熱則流溢滲入脬故

令尿血也

當歸

生地黃

各一兩

續斷

半兩

赤芍藥

一錢

右為末空心蔥白煎湯調下二錢

當歸飲

治妊娘胎動腹痛下血

當歸

切焙一兩

蔥白

細切一握

右拌勻每服五錢以酒一盞半煎至八分去滓溫服

一方治胎動不安腰腹疼痛以水酒同煎服亦將小便服

阿膠飲

出大全良方

治妊娠卒胎動下血不止

阿膠

炙燥

熟乾地黄

焙各二兩

右麤搗篩為散每服三錢正以水酒共一盞煎至七分去滓溫服之一方用阿膠末二兩生地黃半斤搗汁以酒三升絞汁分為三服之一方治尿血為細散葱湯調下或粥飲調服亦可

治妊娠尿血方

出海上方

豆醬

一大盞熬令乾

生乾地黄二兩

右搗羅為末每於食前以粥飲調下一錢服之

治妊娠胎動及下血不止

用百草霜搗羅為細末每服二大錢濃煎芎藭湯

調下食前服之

治胎動出血產門痛

出危氏方

用黃連為末酒服一錢日三服亦治因擊舉重胎

動出血忌猪肉冷水等物

治婦人胎動腰臍下血

用黃脚雞子二枚破着器中以白粉和如稀粥頓服之

治卒胎動不安或腰痛胎轉搶心下血不止

出肘後方

以菖蒲根搗取汁三升服之一方治胎動勞熱下血手足煩悶

治胎動腰痛搶心或有下血

出聖惠方

用檳榔一兩為末并華水煮葱白濃汁調下一錢

若由頓仆及舉重致胎動下血者及腹痛

出肘後方

以赤小豆二升熬令香著雞子十四枚破內小豆

中更熬令黃黑為末和酒服一匕日三服

阿膠酒

出聖惠方

治妊娠無故卒下血不絕方

用阿膠二兩以酒一升半煮膠令消分三服連併服之

葵子飲

出千金方

治妊娠卒下血

方見子淋類

地黃酒

出危氏方

治漏胎下血不止血盡子死方

用生地黃切一升以酒五升煮取三升分三服亦
治落身後血一方用生地黃汁同酒煮服或為末
酒服亦可

又方

出千金方

用葵根莖燒作灰以酒服方寸匕日三粥飲亦得
燒秤錘方 治妊娠卒然下血兼治胎衣不下

用鍤錘燒令赤內酒中如此者三次候溫飲一盞

治妊娠卒胎動不安臍腹痛胎轉搶心下血不止

用麴半斤搗碎和熱水絞取汁三中盞無時分五服一方生麴拌餅水和絞汁服

雞翎酒

治妊娠下血疼痛不止亦治小便不禁

方見
妊娠

門遺失
不禁類

治妊娠損動下血不止

出肘
後方

用鯉魚一斤陳白糯米一升同煮粥食之亦量力

食多少旋煮食之

又方

方見前安胎類
川芎蔥白湯

立聖散

出濟生
拔萃方

治妊娠下血不止

用雞肝二箇煮用酒一升熟共食之大效

療母勞熱胎動下血手足煩躁

用蒲黃根絞汁服一二升

治胎動下血不止

用桃樹上乾不落桃子燒作灰水服差又產後陰
腫痛燒桃仁傅之

治妊娠卒下血不止及治子淋亦治妊娠忽胎動不安
忽但腰痛忽胎轉搶心或下血不止

用艾葉如雞子大以酒三升煮取二升去滓分為
兩服不拘時溫服一方治卒尿血不止用生艾葉
水煎食前服冬用乾者

豆醬散 療妊娠下血

用豆醬二升漉去汁熬令燥末酒服方寸匕日五六服
治婦人有娠半年因傷損腰痛下血

以玉燭散承氣湯四物湯對停加朴硝煎之下數
行痛隨手住血亦止神驗

蠟酒方

出聖惠方

治妊娠胎動腹痛下血不絕欲死

用蠟一錢以清酒二盞煎三五沸投蠟令銷頓服

之效

一方用蠟如雞子大

治妊娠尿血方

用黍穰燒灰酒服方寸匕日三

一作黍穰莖

又方

出肘後方

用阿膠炒令黃燥為散每食前以粥飲調下二錢
必勝散 治妊娠吐血衄血亦治吐血不止

用馬勃以生布擦為末濃米飲調下

昌黎云牛溲馬勃醫師之良也

治妊娠卒尿血不止方

出聖惠方

用生地黃三兩切以水一大盞半煎至八分去滓

食前分為二服

芎藭飲

一名阿膠散
出千金方

治妊娠胎動去血腰腹痛

阿膠

二兩

芎藭

當歸

青竹茹

各五兩

右以水一斗半煮銀二斤取出汁去銀內藥煎取二升半內膠令烱分三服不癰重作一方用甘草二兩無青竹茹水煎一方治漏胎下血過多胃中刺痛止用水煎服

桑寄生湯

一名芎藭散出朱氏集驗方

療妊娠六七月忽胎動下血

腹痛不可忍

桑寄生

四錢 當歸

一兩二錢

川芎

八錢

右以水一升煎取八合下清酒半升煎取八合分三

服如人行五六里再服

療妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛

出大全良方

粳米

五升黃耆六兩

右以水七升煎取二升分為四服一方用秫米

治產前無故下血腹大痛或下黃汁如漆如豆汁者

出鮑氏方

乾薑 當歸 黃耆 芍藥 川芎

各等分

右水煎服此方稍穩重

治妊娠下血如月信通恐胎乾方

出本草方見漏胎類地黃散

治妊娠卒下血

出本草方見前本
門子淋類葵子飲

治妊娠卒下血

出本草

以酒煮白膠二兩消盡頓服及鹿角膠最佳

治卒下血不止

出本草

用龍膽一虎口以水五升煮取二升半分為五服瘥

坐月方位圖并產婦須知法

附論

夫婦人妊娠之後以至臨月臟腑壅塞關節不利切不可多睡須時時行步不宜食粘硬難化之物不可多飲

酒不可亂服藥亦不可以妄行針灸須寬懷減神思慮
不得負重或登高涉險若偶然胎不安腰痛者須服安
胎藥一二服得安即止 又云生產雖然觸穢排次須
要在先入月一日貼產圖并日遊胎殺所在并借地法
於姙婦房內北壁上仍依位設床帳厚鋪茵蓐周密使
無孔竅夏月亦鋪厚蓐用好油單薄席紗帳以備之常
焚香令潔淨備辦湯藥器物既覺欲產不得喧鬧人力
雜亂大小愴惶驚動產婦宜預擇年高歷練坐婆一人

并穩當曾經慣婦人一兩人扶持不得揮霍恐產婦憂
驚又忌閑雜外人并喪孝穢觸之人看視切不得驚動
傷早若坐婆拙不能體候胎氣方轉動之際便為欲生
多端下手驚動傷早則橫倒之憂從此而致也產寶方
云姙婦欲產腹痛雖痛而腰不甚痛者未產也且令扶行
熟忍如行不得則凭物扶立行得又行或衣漿先下然
後作陣若腹痛眼中如火生此是胎離腎經兒逼產門
也即取藥一二服即扶上蓆草切不可坐草早務要產

婦用力存養調停床令坐婆先說論之如覺心中煩悶
可取白蜜一匙用新汲水調下或覺飢即喫軟飯或粥
少許亦須預備勿令飢渴恐產婦無力困乏也若不飢
渴亦不須強食大凡生產自有時候不可強服催生滑
胎等藥或因坐草早勢不獲已則服之若無事強服恐
變生他疾又須戒之若妊娠已滿十月形體成就神識
咸備分氣趨產宜服滑胎湯藥凡婦人妊娠入月不可
沐頭濕冷流于足太陽之經多令子橫逆不順誠之誠

之 夫人之受胎陰注陽生造物已有分定豈容置一
毫人力於其間耶竊聞有以命書究其吉凶利害臨產
之際私心意謂時乖故不令坐草驀遇胎轉便為時良
催發坐草急產意迎就好時而避惡時殊不知妊婦欲
產不得產未當產而強取生以至蹉跎逼迫使產母不
勝痛憤而失全生豈有巢毀卵不破乎又如愛指失掌
掌既已失指何存焉世之評命書者心雖自愧不可追
悔但以數終藉初舉之意而殞者只得聽其不幸哀哉

大凡懷孕雖云十月之胎有七八月而先產者或過月而方生者如堯母妊十四箇月廼娠稟受氣血壯弱之不同蓋猶命書所謂五行欲其自足勿用胎元者是也且晝夜十二時分作百刻人之氣息一萬三千五百呼吸之間便生賢愚安可力取時之好惡而避貧奪富哉然命書曰人之在幼禍福未萌當考目擊之端倪驗作他年之證兆是已生之人猶不可前知休咎況以未生之子伺候好時預定貴賤可乎若如所欲則是不由造

物而反由人嗜命書者故當窮其造物限量之數察其
天地盈縮之理無以偏見而枉殺人胡不聞窮娘偷生
而獲康寧者何蓋無它阻傷犯得任情性生于自然也
今若為誠言切宜戒若以為狂言聽其為之且聞之者
尚不寒而慄奈母子何為之者後雖悟歿於非命然已
獲殺人之過陰譴亦自難逃余切思之可謂恩生於害
而恩未生則害先至矣吁可畏哉 婦人產乳忌反支
月若值此月當在牛皮上若灰上勿令水血惡物著物

則殺人及浣濯衣水皆以器盛過此忌月乃止 凡生
產不依產圖脫有犯觸於後母子皆死若不至死即母
子俱病諸事皆不稱心若能依圖無所犯觸母即無病
子亦易養 凡欲產時特忌多人瞻視惟得三二人在
傍總待產脫乃可告諸人也若人衆視看無不難產

凡產婦第一不得匆匆忙怕傍人極湏穩審皆不得預
緩預急及憂悒則難產若腹痛眼中火生此兒回轉未
即生也兒出脫一切人及母皆忌問是男是女始落地

與新汲水五咽忌與暖湯物勿令母看視穢物 凡產
婦慎食熱藥麵食當識此飲食當如人肌溫溫也 又
云胎神逐月所值方位不可修造 正月在床 二月
在戶 三月在門 四月在竈 五月在身 六月在
竈 七月在房 八月在廁 九月在門 十月在戶
十一月在竈 十二月在床臨月產室貴乎無風不
可太煖煖則生風汗出腠理開便中風昏冒而不知人
急服愈風散繼以交加散服後以右手搔頭大豆紫蘇

湯獨活湯皆可 收產傷胎者蓋婦人臨產之時必召
穩媪三人其二媪極拽婦之臂其一媪頭抵婦之腹中
兩手扳其腰極力為之胎死于腹良久乃下兒亦如血
乃媪婦殺之也豈知瓜熟自落何必如此乎于是因茲
經脉斷閉腹如刀刺大渴不止小便閼絕主病者禁水
不與飲口舌枯燥牙齒齩黑臭不可聞食飲不下昏憤
欲死宜先以冰雪水恣意飲之約二升許痛緩渴止次
以舟車丸通經散前後五六服下數十行食大進仍以

桂苓甘露散六一散柴胡飲子調之則安 又有一婦
患此前證急取秤鈎續以壯繩以膏塗其鈎令其母分
兩足向外偃坐左右各一人脚上立足次以鈎其死胎
命一壯力婦人咬牙拽出死胎下敗血五七升其母昏
困不省待少頃以新冰水灌之漸嚙二日大醒食進次
日四物湯血數日方愈凡婦人產前或煩渴欲水喫者
不若飲米飲為佳

月空方位

正月 三月 五月 七月 九月

十一月 已上在丙壬

二月 四月 六月 八月 十月

十二月 已上在甲庚

逐月安產藏衣忌向方位

凡安產藏衣方位並於卧閣內分布太平聖惠方云
凡妊娠初入月便寫產圖一本以朱書某月某日空
貼在位如正月在丙壬可於壬位安產婦床帳丙位


藏衣之類貼掛在產婦房內北壁上若值閏月只看節氣用之又云每月產圖有雷公招搖運鬼力士天狗軒轅大時咸池吳時豐隆白虎夫人天候狂虎凡十三神並從月建易其位所謂月空者按內經云月廓空無寫王冰注云論月輪中空日也即非十三神之數今太平聖惠方以六陽月在丙壬六陰月在甲庚正如外臺所言正月在丁壬至十二月在甲庚之類其理一也但外臺言之詳聖惠言之簡耳今人多

依聖惠方者特從其簡而已或云凡逐月安產藏衣並向月德月空方位所有十三神殺並從節氣更換若交次月節便作次月用書產圖者非也假如正月十四日立春若姙娠十三日乳卧豈可作去年十二月用也必依月分用之乃是若依節氣更換則天德月德所在差矣然月空與壬謂之中天空頗相類議者以為天空者非十三神之數蓋課中有天乙貴人其位無可與對者故此空是謂天空值此神百事不

宜止宜安產婦床帳藏衣之類耳集聖歷云天德正
月在丁二月在坤三月在壬四月在辛五月在乾六
月在甲七月在癸八月在艮九月在丙十月在乙十
一月在巽十二月在庚又堪輿歷有遊年白虎殺神
在太歲後一盡如太歲在卯則白虎在寅餘倣此推
之若產及藏衣犯之則子母皆不利也 王子享云
難產逆生論稱犯一切神殺固有是理然亦有自然
難產兒自逆生者及有產腸胃俱下者產已則復如

故此非疾病所致氣血所主天下之理蓋有不可窮
詰者亦宜知之

坐 月 方 位



安產藏衣十三神吉凶方位

藏衣安產運鬼雷招軒轅咸豐天狂天夫白

吉方吉方力公搖太池晷時狗虎候人虎

正月 壬丙艮寅寅卯辰辰午申酉戌

二月 坤甲庚乾亥卯子丑未巳酉巳戌亥

三月 丙壬坤申辰酉戌戌午子寅亥子

四月 甲庚巽巳巳午未丑未酉亥子丑

五月 丙壬艮寅午卯辰辰申子申丑寅

六月 庚申乾亥未子丑未酉卯巳寅卯

七月 丙壬坤申申子酉戌戌戌子寅卯辰

八月 庚艮甲巽巳酉酉午戌丑亥卯亥辰巳

九月 丙壬艮寅戌卯辰辰子午申巳午

十月 庚申乾亥亥子丑未丑卯巳午未

十一月 壬巽丙坤申子酉戌戌寅午寅未申

十二月 庚申甲巽巳丑午未丑卯酉亥申酉

安床帳藏衣及藏穢物法

出聖
惠方

正月午地之東安產婦

子地之西藏衣吉

二月酉地之南安產婦

卯地之北藏衣吉

三月子地之西安產婦

午地之東藏衣吉

四月申地之北安產婦

寅地之南藏衣吉

五月子地之西安產婦

午地之東藏衣吉

六月寅地之南安產婦

申地之北藏衣吉

七月子地之西安產婦

午地之東藏衣吉

八月寅地之南安產婦

申地之北藏衣吉

九月午地之東安產婦

子地之西藏衣吉

十月寅地之南安產婦

申地之北藏衣吉

十一月午地之東安產婦

子地之西藏衣吉

十二月酉地之南安產婦

卯地之北藏衣吉


如遇閏月各用本月所吉之地

已前安置產婦及藏衣並於堂內布方位取吉地若
藏衣諸穢污即於宅內分位凡定置產婦地即是月
空宜以此准之仍先作理事畢覆蓋蓋

十二月產圖

出聖
惠方


正月




二月



五月




六月



七月




八月




九月




十月



十一月



十二月



大時 招搖 咸池 吳時 雷公 豐隆 軒轅
白虎 夫人 狂虎 天候 天狗 運鬼力士
右計十三神每月具注如圖產婦犯之大凶如已犯
依後法謝之吉利月空產婦吉天德藏衣吉餘無注
之處平

推婦人行年法第一

生氣方

產婦宜向之坐卧吉
產帳向之開門大吉

反支月

遇此月即鋪灰上用牛皮或馬
驢皮訖鋪草勿令惡血著地吉

禍害方

不得於其上產又不得向之大小便避之大吉

絕命方

不得於其上產又不得向之大小便避之大吉

懸尸日

遇此日產不得攀繩宜懸馬轡攀之大吉

閉肚方

臨月至滿月並不得向之大小便及棄不淨之水謹之吉

八疰方

產帳不得向之開門忌之大吉

產婦推行年法

十三歲至四十九歲

婦人行年十三歲

行年在庚申

反支在正七月

禍害在離

絕命在巽 懸尸在辰戌日 閉肚在辛 生氣
在坤 八疰在甲

宜喚西南黃衣師看產產婦宜着黃衣卧西南首
婦人十四歲

行年在巳未 反支在二八月 禍害在坤
絕命在兌 生氣在離 懸尸在卯酉日 閉肚
在壬 八疰在癸

宜喚南方赤衣師看產產婦着赤衣卧南首

婦人十五歲

行年在戊午 反支在三九月 禍害在乾

絕命在艮 生氣在坎 懸尸在寅申日 閉肚

在癸 八症在壬

宜喚北方黑衣師看產產婦宜着黑衣卧北首

婦人十六歲

行年在丁巳 反支在四十月 禍害在艮

絕命在乾 生氣在震 懸尸在丑未日 閉肚

在甲 八症在辛

宜喚東方青衣師看產產婦宜着青衣卧東首

婦人十七歲

行年在丙辰 反支在五十一月 禍害在震

絕命在坎 生氣在艮 懸尸在子午日 閉肚

在乙 八症在庚

宜喚東北黃衣師看產產婦宜着黃衣卧東北首

婦人十八歲

行年在乙卯 反支在六十二月 禍害在坎

絕命在震 生氣在乾 懸尸在己亥日 閉肚

在丙 八症在丁

宜喚西北黑衣師看產產婦宜着黑衣卧西北首

婦人十九歲

行年在甲寅 反支在正七月 禍害在巽

絕命在坤 生氣在兌 懸尸在辰戌日 閉肚

在丁 八症在丙

宜喚西方白衣師看產產婦宜着白衣卧西首

婦人二十歲

行年在癸丑 反支在二八月 禍害在兌

絕命在巽 生氣在震 懸尸在卯酉日 閉肚
在庚 八疰在乙

宜喚東南青衣師看產產婦宜着青衣卧東南首
婦人二十一歲

行年在壬子 反支在三九月 禍害在離

絕命在艮 生氣在坤 懸尸在寅申日 閉肚
在辛 八疰在甲

宜喚西南黃衣師看產產婦宜着黃衣卧西南首
婦人二十二歲

行年在辛亥 反支在四十月 禍害在坤
絕命在兌 生氣在離 懸尸在丑未日 閉肚
在壬 八疰在癸

宜喚南方赤衣師看產產婦宜着赤衣卧南首

婦人二十三歲

行年在庚戌 反支在五十一月 禍害在乾

絕命在艮 生氣在坎 懸尸在子午日 閉肚
在癸 八症在壬

宜喚北方黑衣師看產產婦宜着黑衣卧北首

婦人二十四歲

行年在己酉 反支在六十二月 禍害在艮

絕命在乾 生氣在震 懸尸在己亥日 閉肚

在甲 八疰在辛

宜喚東南青衣師看產產婦宜着青衣卧東首

婦人二十五歲

行年在戊申 反支在正七月 禍害在震

絕命在坎 生氣在艮 懸尸在辰戌日 閉肚

在乙 八疰在庚

宜喚東北黃衣師看產產婦宜着黃衣卧東北首

婦人二十六歲

行年在丁未 反支在二八月 禍害在坎

絕命在震 生氣在乾 懸尸在卯酉日 閉肚

在丙 八疰在丁

宜喚西北白衣師看產產婦宜着白衣卧西北首

婦人二十七歲

行年在丙午 反支在三九月 禍害在巽

絕命在離 生氣在兌 懸尸在寅申日 閉肚

在丁 八疰在丙

宜喚西方白衣師看產產婦宜着白衣卧西首

婦人二十八歲

行年在乙巳 反支在四十月 禍害在兌

絕命在坤 生氣在巽 懸尸在丑未日 閉肚

在庚 八症在甲

宜喚東南青衣師看產產婦宜着青衣卧東南首

婦人二十九歲

行年在甲辰 反支在五十一月 禍害在離

絕命在巽 生氣在坤 懸尸在子午日 閉肚
在辛 八疰在甲

宜喚西南黃衣師看產產婦宜着衣卧西南首
婦人三十歲

行年在癸卯 反支在六十二月 禍害在坤
絕命在兌 生氣在離 懸尸在巳亥日 閉肚
在壬 八疰在癸

宜喚南方赤衣師看產產婦宜着赤衣卧南首

婦人三十一歲

行年在壬寅 反支在正七月 禍害在乾

絕命在艮 生氣在坎 懸尸在辰戌日 閉肚

在癸 八疰在壬

宜喚北方黑衣師看產產婦宜着黑衣卧北首

婦人三十二歲

行年在辛丑 反支在二八月 禍害在艮

絕命在乾 生氣在震 懸尸在卯酉日 閉肚

在甲 八庄在辛

宜喚東方青衣師看產產婦宜着青衣卧東首

婦人三十三歲

行年在庚子 反支在三九月 禍害在震

絕命在坎 生氣在艮 懸尸在寅申日 閉肚

在乙 八庄庚

宜喚東北黃衣師看產產婦宜着黃衣卧東北首

婦人三十四歲

行年在己亥 反支在四十月 禍害在坎

絕命在震 生氣在乾 懸尸在丑未日 閉肚

在丙 八莊在丁

宜喚西北白衣師看產產婦宜著白衣卧西北首

婦人三十五歲

行年在戊戌 反支在五十一月 禍害在巽

絕命在離 生氣在兌 懸尸在子午日 閉肚

在丁 八莊在丑

宜喚西方白衣師看產產婦宜著白衣卧西首

婦人三十六歲

行年在丁酉 反支在六十二月 禍害在兌

絕命在坤 生氣在巽 懸尸在巳亥日 閉肚

在庚 八症在乙

宜喚東南青衣師看產產婦宜著青衣卧東南首

婦人三十七歲

行年在丙申 反支在正七月 禍害在離

絕命在巽 生氣在坤 懸尸在辰戌日 閉肚
在辛 八疰在甲

宜喚西南黃衣師看產產婦宜著黃衣卧西南首
婦人三十八歲

行年在乙未 反支在二八月 禍害在坤
絕命在兌 生氣在離 懸尸在卯酉日 閉肚
在壬 八疰在癸

宜喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣卧南首

婦人三十九歲

行年在甲午 反支在三九月 禍害在乾

絕命在艮 生氣在坎 懸尸在寅申日 閉肚
在癸 八莊在壬

宜喚北方黑衣師看產產婦宜著黑衣卧北首

婦人四十歲

行年在癸巳 反支在四十月 禍害在艮

絕命在乾 生氣在震 懸尸在丑未日 閉肚

在甲 八疰在辛

宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣卧東首

婦人四十一歲

行年在壬辰 反支在五十一月 禍害在震

絕命在乾 生氣在艮 懸尸在子午日 閉肚

在乙 八疰在庚

宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣卧東首

婦人四十二歲

行年在辛卯 反支在六十二月 禍害在震

絕命在坎 生氣在艮 懸尸在巳亥日 閉肚

在丙 八莊在丁

宜喚東北黃衣師看產產婦宜著黃衣卧東北首

婦人四十三歲

行年在庚寅 反支在正七月 禍害在坎

絕命在震 生氣在乾 懸尸在辰戌日 閉肚

在丁 八莊在丙

宜喚西北白衣師看產產婦宜著白衣卧西北首
婦人四十四歲

行年在己丑 反支在二八月 禍害在巽
絕命在離 生氣在兌 懸尸在卯酉日 閉肚
在庚 八莊在乙

宜喚西方白衣師看產產婦宜著白衣卧西首
婦人四十五歲

行年在戊子 反支在三九月 禍害在兌

絕命在坤 生氣在巽 懸尸在寅申日 閉肚
在辛 八症在甲

宜喚東南青衣師看產產婦宜著青衣卧東南首
婦人四十六歲

行年在丁亥 反支在四十月 禍害在離

絕命在震 生氣在坤 懸尸在丑未日 閉肚
在壬 八症在癸

宜喚西南黃衣師看產產婦宜著黃衣卧西南首

婦人四十七歲

行年在丙戌 反支在五十一月 禍害在坤

絕命在兌 生氣在離 懸尸在子午日 閉肚

在癸 八莊在壬

宜喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣卧南首

婦人四十八歲

行年在乙酉 反支在六十二月 禍害在艮

絕命在乾 生氣在震 懸尸在己亥日 閉肚

在甲 八症在辛

宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣卧東首

婦人四十九歲

行年在甲申 反支在正七月 禍害在震

絕命在坎 生氣在艮 懸尸在辰戌日 閉肚

在乙 八症在庚

宜喚東北方青衣師看產產婦宜著青衣卧東北首

八月預備藥物

出聖
惠方

保氣散 佛手散 枳殼散 神寢丸 保生丸

榆白皮散 催生丹 黑神散 花藥石散 大

聖散 黑龍丹 催生符 葵子 黃連 竹茹

烏梅 海馬 雌雄石燕 理中丸 棗子 陳

皮 延胡索 桑寄生 夜合枝 蒲黃 紅藍

花 桂心 蛇蛻 半夏 白朮 茯苓 人參

甘草 補骨脂 羚羊角 當歸 赤芍藥 神

麴 牡丹 枳殼 竹瀝 枳實 細辛 鯉魚

鱗灰 羌活 麝香 桃仁 狗膽 郁李仁

亂髮灰 杏仁 童子小便 瞿麥 蘼艾 水

銀 沒藥 川芒硝 騏驎竭 防風 豆豉

琥珀 秤錙 桑根白皮 醎醋 木通 芎藭

無灰酒 乾薑 川升麻 紫葛 荷葉 虎脰

骨 香墨 紅花子 生地黄 白蜜 羚羊角

蘇楞木 熟朱砂 劉寄奴 羚羊角灰

已上藥妊娠三數月即須求覓州土上好者曬曝收

拾一一題記分明置一靜處恐臨時忙迫不可卒求
更宜審細勿令錯用

生地黃

肥好者
害之

生母薑

略點
收

生藕

和本泥
收濕處

雞子

草中

收

釀頭糠醋

煎三四沸
乾瓶盛之

黑豆

揀之布拭用
紙袋貯一斗

艾

生熟
並要

右件藥入月一日皆須收足

產婦雜要物

出聖
惠方

白米

煮粥砂瓶

煎藥爐

銚子

醋炭盆

湯瓶

軟硬炭

洗兒肥皂頭髮

卧交椅子

斷臍綿及剪刀

斷臍本不用刀只用帛裹或齒齧斷

燈籠 火把

繳巾

油燭

發燭

燈心

小石子

三五十顆貯一篋子

中臨產燒下沃醋兩盆子盛更置產婦面前醋氣必須猛裂無小石以小磚子代之

搗床頭

磚

八硯一騰取一硯止三恐臨時卒難求覓

盛衣餅

葫蘆尤妙

洗兒盆

大書字號

雜用盆

乾柴竹并茅

砂盆

雜席蒲盒

各一項

濾藥布

絞地黃汁布

新柳木米

提碎暖水釜

已上者泥在近處入月後晝夜須要煖水

軟厚氈

半領

乾蓐草

揀三二束乾馬

糞

一石餘欲產布放地蓐大妙

馬皮

一張銷馬糞上

馬嚼

一具臨產執之產下去之

赤馬通

每日收不用乾者

童子小便三升

產婦入月切不得飲酒恐臨產心神昏亂亦不得驚動恐未及產時左右驅使人亦不可喫酒入月門前不得停留形迹客宿


右已前貯備頗為猥細若言所切無過於斯通識者方驗其不可忽略也

入月安產圖

凡產於八月一日貼卧閣內正北壁若安產藏衣方

位並於卧閣內分布若逐月安產藏衣避忌神殺方
位隨節氣更換候交得次月節即換次月產圖若產
訖棄沃穢污不淨之水並隨藏衣之方所向不拘遠
近棄之切忌向閑肚之方也

日遊圖



推日遊法

出聖
惠方

凡推日遊法常以癸巳日入宮一十六日宜避之至
巳酉方出外

癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉

五日在紫
微北宮

戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅

五日在太
微南宮

癸卯

一日在天
廟西宮

甲辰 乙巳 丙午 丁未

戊申

五日在御
女東宮

右件日遊神在內產婦宜外別於空地安帳大吉利

巳酉

在外庚戌

辛亥

壬子

癸丑

甲寅

在外東
北維

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未

在外東

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

甲子

乙丑

在外東
南維

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

在外南

辛未

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

丙子

在外西
南維

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

在外西

壬午

癸未

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

在外西
北維

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

在外北

右件日遊在內宜在外產在外宜在內產安床帳大吉
逐日產母生子宜向方

子午卯酉日宜向南方 寅申巳亥日宜向西北方
辰戌丑未日宜向東南方

逐日日遊神

癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 在房內北

庚子 辛丑 壬寅 在房內南 癸卯 在房內

西 甲辰 乙巳 丙午 丁未 在房內東

金匱要略卷三十四
六戊六巳 在房內中央 餘日在房外吉

凡行年命相值 亦可坐馬皮攀轡吉

體玄子借地法

出聖
惠方

東借十步

西借十步

南借十步

北借十步

上借十步

下借十步

凡辟方之中四十餘步產安借地恐有穢汚或有東海神王或有西海神王或有南海神王或有北海神王或有遊擊將軍白虎夫人遠去十丈軒轅招搖舉

高十丈天符地輔入地十丈令此地空閑祐此中產婦某氏安居無所妨礙無所畏忌諸神擁護百鬼速去急急如律令已前借地法八月一日即寫一本貼在床帳正北壁上更不須避日遊反支及諸神殺候產罷滿日除之

產婦衣色及首指并起日法

出聖
惠方

甲乙日生產勿著白衣宜著黑衣卧勿西首勿庚辛日起 丙丁日生產勿著黑衣宜著青衣卧勿北首

勿壬癸日起 戊己日生產勿著青衣宜著赤衣卧
勿東首勿甲乙日起 庚辛日生產勿著赤衣宜著
黃衣卧勿南首勿丙丁日起 壬癸日生產勿著黃
衣宜著白衣卧勿東南首勿戊己日起

禳謝法

出聖
惠方

軒轅者乾神天之丞相使者風伯也犯之令兒驚吐
取梨枝六寸埋產處吉

雷公者震神太陰之使者天馬也犯之令兒煩悶腹

滿解之用三家屠肉餅於產處謝之吉

咸池者坎神天之兩師使者犯令兒啼不止用酒羊脯於產處謝之吉

豐隆者艮神天之東明使者天漢也犯之令兒乍寒乍熱用白魚二頭於產處謝之以黑豆一掬投於井中吉

招搖者坤神太上使者犯之兒驚空嚼不止用酒餅於產處謝之吉

天候者巽神天之執法使者犯之令兒腹脹努眼用
白魚二頭於產處謝之吉

吳時者離神天之大將軍遊擊使者犯之令兒驚腹
痛用馬脯五寸於產處謝之更用白魚五枚早於產
處埋之吉

大時者兌神北斗之使者犯之令兒腹脹下利解之
用馬脯於產處謝之又用大豆一升投於井中吉
犯狂虎者令兒驚啼用雄雞於產處謝之吉

犯白虎者用粳米一升雞子三枚謝之吉

犯夫人者用羊脾三枚粳米一升於產處謝之吉

犯天狗者令兒口噤面色變用三家屠肉并麥飯於
產處謝之吉

禁草法

鋪草及氈席訖即呪曰

鐵鐵湯湯非公所當是王一言得之銅一言得之鐵
母子相生俱熨貼急急如律令

日曆法

甲子日

在內面向東北
西南二角吉

乙丑日

在內面向西南西
北東南三角吉

丙寅日

在內面向西南
西北二角吉

丁卯日

在內面向西南
西北二角吉

戊辰日

在內面向西南
西北二角吉

己巳日

在內面向西北
東北二角吉

庚午日

在內面向西北
東北二角吉

辛未日

在內面向西北東
南東北三角吉

壬申日

在內面向東南
東北二角吉

癸酉日

在內面向西北東
北東南三角吉

甲戌日

在內面向東南
西南二角吉

乙亥日

在內面向東北
西南二角吉

丙子日

在內面向西南
東北二角吉

丁丑日

在內面向西南西
北東南三角吉

戊寅日

在外面向西北
西南二角吉

己卯日

在外面向東南西
南西北三角吉

庚辰日

在內面向東北
西北二角吉

辛巳日

在內面向西北西
南東北三角吉

壬午日

在內面向西南
東北二角吉

癸未日

在內面向東南
東北二角吉

甲申日

在內面向東南
西北二角吉

乙酉日

在內面向東南西
北東北三角吉

丙戌日

在內面向東北
西南二角吉

丁亥日

在內面向東北西
南東南三角吉

戊子日

在內面向西南
東北二角吉

己丑日

在內面向東南西
南西北三角吉

庚寅日

在內面向東南
西北二角吉

辛卯日

在內面向東南
西北二角吉

壬辰日

在內面向西南
東北二角吉

癸巳日

在外面向西南東
北西北三角吉

甲午日

在外面向西南
西北二角吉

乙未日

在外面向東南西
北東北三角吉

丙申日

在外面向西北
東北二角吉

丁酉日

在外面向西北東
南東北三角吉

戊戌日

在外面向東北
西南二角吉

己亥日

在外面向東北東
南西南三角吉

庚子日

在外面向東南
東北二角吉

辛丑日

在外面向東南東
北西南三角吉

壬寅日

在外面向東南
西南二角吉

癸卯日

在外面向東南西
南西北三角吉

甲辰日

在外面向西南
西北二角吉

乙巳日

在外面向西北西
南東北三角吉

丙午日

在外面向西南東
北西北三角吉

丁未日

在外面向西北西
南東北三角吉

戊申日

在外面向西北
東北二角吉

己酉日

在外面向東南西
北東北三角吉

庚戌日

在內面向東北
東南二角吉

辛亥日

在內面向東南
西南二角吉

壬子日

在內面向東南東
北西南三角吉

癸丑日

在內面向東南
西南二角吉

甲寅日

在內面向東南
西北二角吉

乙卯日

在內面向東南西
南北三角吉

丙辰日

在內面向西南西
北東北三角吉

丁巳日

在內面向西南西
北東北三角吉

戊午日

在內面向西南西
北東北三角吉

己未日

在內面向西北東
南東北三角吉

庚申日

在內面向西北東
南東北三角吉

辛酉日

在內面向西北東
南東北三角吉

壬戌日

在內面向東南
西北二角吉

癸亥日

在內面向東南
北吉又云凡日歷

十二辰前神殺常忌不
可向產日宜須檢看

安置產婦法

凡欲產時以朱砂點產婦項後宛宛中又點鼻孔間
柱兩傍宛宛中牛穿据處即向產處咒之曰此地空
閑安居產婦某姓就此吉處諸神擁護百鬼速去莫
相觸忤三呪之訖即燒火於產處四方以井華水四
器亦置產處四方各橫刀於水上其刀淨磨拭之又
法捉一刀子先向產處呪曰一尺刀子七寸刀拒以反
支而治運如此三呪訖釘刀子着產處地上然後坐產

胎殺避忌產前將護法

一受孕之後切宜避忌胎殺所遊如經云刀犯者形
必傷泥犯者竅必塞打擊者色青黯繫縛者相拘縛
甚至母殞驗若掌斷不可忽

月遊胎殺

立春在房床

驚蟄在戶

單扇

清明在門

雙扇

立夏在竈

芒種在母身

小暑在竈

立秋在井

按京本云在正北方午位

白露在厨側

寒露在門

立冬在戶及厨 大雪在爐及竈 小寒在房母身

十干日遊胎殺

甲己日占門 乙庚日占碓磨 丙辛日占井竈

丁壬日占厨廨 戊癸日占母倉

十二支日遊胎殺

子丑日占中堂 寅卯辰酉日占竈 巳午日占門

未申日占籬下 戌亥日占房

六甲旬遊胎殺

甲子旬遊窻確 甲戌旬遊正廳 甲申旬遊中庭
甲午旬遊房內 甲辰旬遊房中 甲寅旬遊房外
已上遊在房內不宜於方位上安床帳及掃舍皆凶
凡在小兒殺及本年三殺及產母身本命皆不可犯凡
妊娠之後將此貼於當眼常照應之切不可穿鑿修
掘移釘繫籬壁重物展壓之數犯之重則胎死腹中
母亦不利輕則子受其殃成人之後必定破形掌跛
縮瘡瘰癧犯之極驗

孕婦藥忌歌

玃斑水蛭地膽蟲 烏頭附子配天雄 躑躅野葛

螻蛄類 烏喙側子及蚤蟲 牛黃水銀并巴豆

大戟蛇蛻及蜈蚣 牛膝黎蘆蕪荳豉 金石錫粉

及雌雄 牙硝芒硝牡丹桂 蜥蜴飛生及麝蟲

代赭蚱蟬胡粉麝 芫花薇御草三稜 槐子牽牛

并皂角 桃仁蟻螬和茅根 櫟根硝砂與乾漆

亭長波流茵草中 瞿麥蘭茹蠓瓜甲 蝟皮赤箭

赤頭紅 馬刀石蠶衣魚等 半夏南星通草同

乾薑蒜雞及雞子 驢肉兔肉不須供 切忌婦人

產前忌 此歌宜記在心宵

禁水法

出聖惠方

欲產時貯水呪曰

南無三寶水 水在井中為井水 水在河中為河

水 水在器中為淨水 水在法中為真水 自知

非真 莫當真水 以淨持濁 以正治邪 日遊

月殺 五土將軍 青龍白虎 朱雀玄武 招搖

天狗 軒轅女妖 天吞地吞 懸尸開肚 六甲

禁諱 十二神王 土符伏神 各安所在 不得

動靜 不得忌干 若有動靜 若有忌干

一云頭破

七分 一云身不完具 一云施大神咒 一云當攝汝形 阿佉尼 阿毗羅

莫多黎 婆地黎 娑訶

產前將護法

出和劑局方

按諸家產論云凡產婦入月忌飲酒產時心神昏亂臨產之時不可令傍人喧擾大小愴忙慮致驚動產母祇

可令熟事產婆及穩當謹卓老成親密三兩人扶侍產
母初覺腹痛且宜任意坐卧勉強飲食恐致令產氣力
虛羸若腹痛漸甚唯且熟忍仍可按節次漸服滑胎榆
白皮散一二服藥之法慎勿太早須得其時又傍人不
得逼迫且須令人扶策徐徐而行若行步稍難即凭物
而立須臾扶策再行直至腹痛連腰相引脹痛頻即服
催生丹一服更且勉強扶行陣痛轉甚難以立認是產
時將至即服催生符畢然後安詳上草上草之時慎勿

傷早若太早則子在腹中難以轉側又須仔細體候直待兒逼欲生然後令抱腰也抱腰之人不得傾斜則兒得順其理自然易產也又有卧產者亦待卧定背平着席體不偃曲則子不失其道苟或不能依此節適必致產難縱或幸免必須變生諸疾

產後將護法

出和劑局方

按經云婦人非止臨產須憂至於產後大須將理慎勿以產時無他乃縱心恣意無所不犯犯時微若秋毫感

病重於嵩嶽且纔得分娩切忌問是男是女看血下多少隨證服壓血運藥良久喫粥服四順理中丸便令人從心下按至臍腹日五七次若有疾證即隨證服藥粥藥相間頻頻飲且宜閉目而坐背後倚物左右肩承常令直立兩膝雖時眠睡頻頻亦須過一復時方得上床亦須立膝高搗床頭厚鋪裯褥遮圍四向窒塞孔隙恐禦賊風一臘之後常聞醋烟以防暈悶一臘之後漸加滋味或以羊肉及雌雞煮取濃汁作糜粥直至百晷常

服當歸丸當歸建中湯四順理中丸日各一兩服以養
臟氣補血脈兩臘之後方得食糜爛肉食滿月之內尤
忌任意飲食觸冒風寒恣情喜怒梳頭用力高聲作勞
工巧之類及上廁便溺如此節養將攝以至百晷始得
氣血和調腑臟平復設不依此即致產後餘疾

普濟方卷三百四十四